

Cinnarizine

【OSTUG】Narizin® 25mg/Tab

ATC Code : N07CA02

中文名：納利吉錠 «強生»

適應症：噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

藥理分類：**Antiemetic; Calcium Channel Blocker.**

用法用量：**Administration** : orally, taken after meals.

Indications and dosage regimen :

Cerebrovascular disorders: 25mg TID.

Motion sickness:

Adult:

25 mg, 30 minutes before travel; then 25mg Q6h during the travel;

children 5-12 yr:

one-half the adult dose.

Peripheral vascular disorders:

25~75 mg TID.

Vertigo & vestibular disorders:

25 mg TID.

不良反應：嗜睡、腸胃不適、頭暈、頭痛、口乾。

交互作用：

- **Azelastine** (Nasal) may enhance the CNS depressant effect of Cinnarizine.
- Cinnarizine may enhance the CNS depressant effect of **Orphenadrine, Flunitrazepam, Buprenorphine, Opioid Agonists.**

注意事項：1.建議飯後服用。
2.勿與含酒精性飲料併服。
3.服藥期間請小心開車或操作危險機械。

懷 孕 期：孕婦使用的安全性尚未建立，縱使動物試驗並未顯示有致畸胎的變化。懷孕期間，若使用本品不可與其他藥物併服。

授 乳 期：本品尚未知道是否會從乳汁分泌出來，所以應選擇停藥或停止授乳。