

Oseltamivir

【O1216】 疾管專用 Eraflu® 75mg/Cap *ATC Code : J05AH02*

中文名： 易剋冒膠囊 75 毫克 «永信藥品»

【O1215】 疾管專用 Tamiflu® 75mg/Cap *ATC Code : J05AH02*

【OTAM】 自費 Tamiflu® 75mg/Cap *ATC Code : J05AH02*

中文名： 克流感膠囊 «Roche»

適應症： 成人和兒童（包含足月新生兒）的流行性感冒之治療。成人和 1 歲或以上兒童的流行性感冒之預防。

藥理分類： **Antiviral Agent; Neuraminidase Inhibitor.**

用法用量： **Administration:** orally, taken without regard to meals; with meals may improve GI tolerability.

Indications and dosage regimens:

Note:

■ For treatment of influenza A or B, initiate oseltamivir within 2 days after onset of symptoms; efficacy not established if treatment begins > 40 hours after symptoms have been established.

■ For prevention of influenza A or B, initiate within 2 days after exposure.

Treatment of Influenza A or B Virus Infections:

— **Adult & ≥ 13 years of age:**

75 mg BID for 5 days.

— **Patients with Clcr 10-30 mL/min:**

75 mg QD for 5 days.

— **Pediatric 1-12 years of age:**

Weight(kg)	Daily Dosage
≤ 15	30 mg twice daily for 5 days
> 15 to 23	45 mg twice daily for 5 days
> 23 to 40	60 mg twice daily for 5 days
> 40	75 mg twice daily for 5 days

未滿 1 歲兒童服用的建議劑量為*：

體重	建議劑量，為期 5 天	調製口服懸浮液的 容量(6 mg/mL)
3 公斤	9 毫克，每天 2 次	1.5 毫升，每天 2 次
4 公斤	12 毫克，每天 2 次	2.0 毫升，每天 2 次
5 公斤	15 毫克，每天 2 次	2.5 毫升，每天 2 次
6 公斤	18 毫克，每天 2 次	3.0 毫升，每天 2 次
7 公斤	21 毫克，每天 2 次	3.5 毫升，每天 2 次
8 公斤	24 毫克，每天 2 次	4.0 毫升，每天 2 次
9 公斤	27 毫克，每天 2 次	4.5 毫升，每天 2 次
10 公斤	30 毫克，每天 2 次	5.0 毫升，每天 2 次

*本表並未包含此族群的所有可能體重。有關年齡未滿 1 歲的所有病患，不論病患體重多少，均應使用 3 mg/kg 來決定劑量。

Prevention of Influenza A or B Virus Infections:

– Adult & ≥ 13 years of age:

75 mg once daily given for at least 7 days after close contact with an infected individual.

75 mg once daily given for up to 6 weeks during a community outbreak of influenza.

– Patients with Clcr 10-30 mL/min:

75 mg once every other day

1 歲或以上兒童服用來預防的建議劑量為：

體重	建議劑量，為期 10 天	調製口服懸液的容量 (6 mg/mL)
≤15 公斤	30 毫克，每天 1 次	5.0 毫升，每天 1 次
>15-23 公斤	45 毫克，每天 1 次	7.5 毫升，每天 1 次
>23-40 公斤	60 毫克，每天 1 次	10.0 毫升，每天 1 次
>40 公斤	75 毫克，每天 1 次	12.5 毫升，每天 1 次

註：口服懸液的調製請參考說明書。

不良反應： 偶有頭暈、喉痛，噁心、嘔吐但與感冒症狀類似。

注意事項： 1.空腹或與食物一起服用皆可。2.若有噁心嘔吐發生，可與食物或牛奶併服。

懷 孕 期： 雖然尚未進行過任何針對孕婦使用 oseltamivir 的對照性臨床試驗，但..。在考量已知的安全性資料、流行中之流行性感冒病毒株的致病性、及懷孕婦女本身狀況後，懷孕婦女可能可使用 Tamiflu。

授 乳 期： Oseltamivir 0.01 mg/day 及其活性代謝物 0.3 mg/day 各別會被分泌至人類乳汁中，因此，本品限於判斷其治療上的有益性超越危險性時才可給藥。

使用規定： 1. 限符合類流感病例定義(突然發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)及呼吸道症狀；肌肉痠痛、頭痛、極度倦怠感其中一種症狀者；排除單純性流鼻水、扁桃腺炎與)，且檢驗 A 型流感病毒抗原陽性病患使用。應於症狀發生 48hr 內開始使用，連續 5 天。
2. 擴大使用對象：請詳閱『衛生福利部疾病管制署』當年的公告。

備 註： 1、代碼【OTAM】藥劑健保不給付。

2、代碼【O1216】、【O1215】之藥劑為疾管局免費支應。