

Telmisartan

【OTELM】 Telmisartan Sandoz (Telmisartan) 80mg/Tab *ATC Code : C09CA07*

中文名： 泰迷平山德士錠 80 毫克 «Sandoz»

適應症： 原發性高血壓。降低心血管風險。

藥理分類： **Angiotensin II Receptor Blocker; Antihypertensive.**

用法用量： **Administration:** orally, administer with or without food.

Indications and Dosage regimen:

Hypertension:

Initial, 40 mg QD; after 4-8 weeks, may titrate to 80 mg QD.

Cardiovascular risk reduction:

80 mg QD.

Note: It is unknown whether doses <80 mg daily are associated with a reduction in risk of cardiovascular morbidity or mortality.

In patients with mild to moderate hepatic impairment should not exceed 40 mg once daily.

不良反應： 低血壓、腹瀉、眩暈、頭痛、疲倦、高血鉀。

交互作用：

- **ACEIs:** **increased** risk of adverse events (ie, hypotension, syncope, hyperkalemia, changes in renal function, acute renal failure).
- **ANGIOTENSIN RECEPTOR BLOCKERS:** **increased** risk of hyperkalemia.
- **DIGOXIN:** **increased** risk of digoxin toxicity (nausea, vomiting, arrhythmias).
- **CELLCEPT®:** **decreased** mycophenolate exposure and reduced efficacy.
- **LITHIUM:** **increased** risk of lithium toxicity.
- **TRIMETHOPRIM:** **increased** risk of hyperkalemia.

注意事項：

- 1.飯前或飯後服用均可；避免經常食用含鉀代鹽。
- 2.本品易吸濕，不可研磨；藥錠自鋁箔取出後，應立即使用，以免受潮。
- 3.Telmisartan 最大之降血壓效果通常是在開始治療的 4-8 週出現。

懷 孕 期：

- 1.避免使用。發現懷孕時，應儘早停止使用 Micardis®。
2. **[US Boxed Warning]: Drugs that act on the renin-angiotensin system can cause injury and death to the developing fetus. When pregnancy is detected, discontinue as soon as possible.**

授 乳 期： 因為有潛在不良反應，應考量對母親的重要性決定是否停止哺乳或停用藥物。目前仍未知本藥是否會經乳汁分泌。