

Tramadol HCl , Acetaminophen

【OTRAE】Traceton<sup>®</sup> Tablet

ATC Code : N02AX52

中文名：服安痛膜衣錠 «永信»

適應症：使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

成分：Each tablet contains:

Tramadol HCl ..... 37.5 mg

Acetaminophen ..... 325 mg

藥理分類：Analgesic Combination (Opioid); Analgesic, Opioid.

用法用量：Safety and efficacy not established in children < 16 yr.

**Administration:** administer **orally** without regard to meals; **do not crush or chew.**

**Dosage:**

**Adults:**

2 tablets every 4 to 6 hours as needed for 5 days or less; MAX, 8 tabs/day.

**Note:**

1. Patients with hepatic impairment should NOT receive tramadol in fixed combination with acetaminophen.
2. Patients with Clcr 30 mL/min should receive a maximum of 75 mg of tramadol in fixed combination with acetaminophen every 12 hours.
3. Geriatric patients, initiate therapy at the lower end of the dosage range. > 75 yrs, MAX 8 tabs/day.

不良反應：最常被報告的不良反應為噁心、暈眩及嗜眠。

注意事項：1.肝、腎功能不佳者及年長者應調整劑量。  
2.服用 SSRI、TCA 及其它三環化合物或鴉片的病人，並用本劑會增加癲癇發作的危險性。  
3.服用 MAOI、抗精神分裂症藥物或其它會降低癲癇發作閾值的藥物之病人，並用本劑可能會增加癲癇發作的危險性。

懷孕期：Tramadol 會透過胎盤。對於人類懷孕期間使用 tramadol 安全性的研究證據仍不足夠。因此，tramadol 不應被使用於懷孕的婦女身上。懷孕期間長期使用可能會造成新生兒戒斷症候群。

授乳期：不建議使用。

使用規定：全民健保藥品給付規定：限用於中度至嚴重性疼痛之病人，須符合下述條件。  
1、經其他止痛藥或 NSAIDs 治療後仍無法控制疼痛或有嚴重副作用者。  
2、非癌症病患使用超過 5 天時，須檢附疼痛評估報告，並每隔 3 個月再評估 1 次，內容須含疼痛強度及疼痛緩解的 VAS 與 VRS。