

Linagliptin

【OTRAJ】Trajenta® 5mg/Tab

ATC Code : A10BH05

中文名：糖漸平膜衣錠 «百靈佳般格翰»

適應症：第二型糖尿病。

藥理分類：Antidiabetic Agent, Dipeptidyl Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitor.

用法用量：**Administration:** orally, taken with or without food.

Dosage regimen:

Type 2 diabetes: 5 mg once daily.

Dosage adjustment:

Significant drug interactions exist, requiring dose/frequency adjustment or avoidance. Consult drug interactions database for more information.

不良反應：低血糖（冒冷汗、顫抖、眩暈、焦慮、飢餓）、頭痛、咽喉炎、上呼吸道感染。

注意事項：Rifampin 可降低 linagliptin 的暴露量，顯示 Trajenta®與強效 P-gp 或 CYP 3A4 誘發劑併用時，其功效可能降低。因此，當 linagliptin 須與 P-gp 或 CYP 3A4 誘發劑併用時，強烈建議應改用其他替代療法。

交互作用：1. strong CYP3A4 or P-gp **inducers** (eg, rifampin, rifapentine, rifabutin, phenytoin, carbamazepine, St. John's wort)：↓linagliptin exposure.
2. fluoroquinolones: may result in changes in blood glucose and increased risk of hypoglycemia or hyperglycemia.

懷 孕 期：尚未針對懷孕女性進行適當且有良好對照組的研究。僅在有明確需要時，方可於懷孕期間使用本藥物。

授 乳 期：現有的動物實驗數據顯示，linagliptin 會以母乳對血漿 4:1 的比值分泌至母乳中。目前仍不清楚本藥物是否會分泌至人乳中。由於許多藥物皆會分泌至人乳中，因此在哺乳女性使用 Trajenta®時，應謹慎為之。