

Labetalol HCl

【ITRAD】 Trandate® 25mg/5mL/Amp

ATC Code : C07AG01

中文名： 湍泰低注射液 «GSK»

適應症： 高血壓。

【OTRAL】 Labtal® 200mg/Tab

ATC Code : C07AG01

中文名： 壓血泰膜衣錠 «杏輝»

適應症： 高血壓。

藥理分類： **Antihypertensive; Beta-Blocker With Alpha-Blocking Activity.**

用法用量： **Note:** When discontinuing therapy, gradually reduce dose over a period of about 2 weeks.

Administration: orally, tablets should be taken with food.

Indications and dosage regimen:

Hypertensive (severe):

— Repeat IV injection

initial, 20 mg over 2 min, followed by 40-80 mg at 10 min intervals until optimum antihypertensive effect is achieved; MAX total dose, 300 mg.

— Slow continuous infusion

50-200 mg IV at 2 mg/min IV; MAX total dose, 300 mg IV.

Hypertension:

— Orally, initial, 100 mg BID; may increase dose in increments of 100 mg BID every 2-3 days; maintenance, 200-400 mg BID.

— IV to ORAL conversion:

Initial, 200 mg ORALLY, followed in 6-12 hr by 200-400 mg ORALLY depending on BP response.

Severe hypertension:

Orally, maintenance, up to 1200-2400 mg daily (divided 2-3 times/day); titration increments should not exceed 200 mg BID.

不良反應： 頭痛、疲倦、眩暈、抑鬱、昏睡、鼻充血、發汗及腳踝水腫。

交互作用：

- Nonselective Beta-Blockers: ↓ the bronchodilatory effect of Beta2-Agonists, avoid combination.
- Alpha1-Blockers: ↑ the orthostatic hypotensive effect of Alpha1-Blockers.
- Amiodarone: ↑ the bradycardic effect of Beta-Blockers.

注意事項：

1. 心衰竭、氣喘、第二或三期心傳導阻斷、心臟休克、持續性低血壓、嚴重心跳徐緩之患者禁用本劑。
2. 當周圍血管收縮顯示低心輸出量時，labetalol 之注射劑即禁用於控制伴隨急性心肌梗塞的偶發性高血壓。
3. 不建議用於氣喘或曾有障礙性呼吸道病使者，因可能導致支氣管痙攣。
4. 注射液應避光儲存，未使用之靜脈滴注混合液應於配製後 24 小時即丟棄。

懷 孕 期： 除非治療效益大於潛在風險，否則不應在懷孕頭三個月期間使用。

授乳期： Labetalol 可從乳汁中排出，但未有任何報告指出對哺乳的嬰兒有不良反應。
Labetalol 很少會引起可逆的肝臟性及膽汁鬱滯性黃疸，萬一有黃疸現象應立即停藥。

相容輸注液： D5W、NS、D5S、Ringer's、Lactated Ringer's、2.5% dextrose and 0.45% NaCl;
5% dextrose and 0.33%NaCl。 (Labetalol 與 sodium bicarbonate 5%不相容)