

Amitriptyline HCl

【OTRY1】 Tryptanol (Trynol®) 10mg/Tab

ATC Code : N06AA09

中文名： 德利能糖衣錠 «強生»

適應症： 憂鬱病。

藥理分類： Antidepressant, Tricyclic (Tertiary Amine).

用法用量： **Administration:** Orally, administer in up to 4 divided doses or as a single daily dose at bedtime to avoid daytime sedation.

Dosage regimens:

Major Depressive Disorder:

— Adults, **outpatients**

Initially, 75 mg orally in divided doses or 50-100 mg once daily at bedtime.

Increase dosages in 25- or 50-mg increments up to MAX of 150 mg/day.

Maintenance: 50-100 mg at bedtime.

— Adults, **hospitalized patients:**

Initially, 100 mg daily; dosage may be increased gradually to 200-300 mg daily as needed.

— Adolescents ≥ 12 yr & geriatric patients:

10 mg TID plus 20 mg at bedtime.

不良反應： 口乾、便秘、嗜睡、心律不整、血壓異常。

注意事項： 1. 空腹或與食物一起服用皆可。
2. 服藥期間請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。

交互作用： 1.與 MAOIs 併用可能導致嚴重甚至致命之危險，兩者不得併用，或於停用 MAOIs 至少隔 14 天後，再開始使用本品。
2.Cisapride：不得併用，以免發生心律不整。

懷 孕 期： 避免懷孕時使用，除非經過醫師的判斷，其預期的效益超越對胎兒的危險。

授 乳 期： Imipramine 會由乳汁排除。建議停止哺乳或停止用藥。