

Atorvastatin

【OTUL】Tulip® 20mg/Tab

ATC Code : C10AA05

中文名： 妥寧膜衣錠 «Sandoz»

適應症： 高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。

藥理分類： **Antilipemic Agent, HMG-CoA Reductase Inhibitor.**

用法用量： **Administration:** administer orally at any time of day without regard to meals.

Indications and dosage regimens:

Cardiovascular disease prevention:

10 ~20mg QD

Dyslipidemia:

10-80 mg QD; evaluate lipid levels after 2-4 wk and adjust doses accordingly.

Heterozygous familial hypercholesterolemia:

in boys and postmenarchal girls 10-17 yr,
initially 10 mg/day; titrate at 4- wk intervals up to
MAX 20 mg/day.

Homozygous familial hypercholesterolemia:

80 mg QD

Dosing in renal impairment:

- Mild to severe impairment: No dosage adjustment necessary.
- Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Poorly dialyzed: No supplemental dose or dosage adjustment necessary.
- Peritoneal dialysis: No dosage adjustment necessary.

Dosing in hepatic impairment:

- **Child-Turcotte-Pugh class A:** No dosage adjustment necessary.
- **Child-Turcotte-Pugh class B:** Use only when benefit likely outweighs risk.
Initial: 20 mg QD; Max dose: 20 mg/day.
- **Child-Turcotte-Pugh class C:**
 - Use of a hydrophilic statin (eg, **rosuvastatin**) is recommended.
 - If use of atorvastatin is deemed necessary:
Initial: 10 mg QD; Max dose 10 mg QD.

用於 10 歲以下兒童之安全性與有效性尚未確立。

不良反應： 頭痛、肌肉痛、腹痛、便秘、胃腸脹氣、噁心。

交互作用： 1.本品若與 azole 類抗黴菌劑、cyclosporine、fibrin acid 衍生物、erythromycin 或 niacin 並用，則會增加發生肌病的危險性。
2.應避免與紅麴類食品並用(紅麴(monascus)含有天然的 statin)，以免體內 statin 含量過高，影響肝功能。
3.使用 atorvastatin 期間不建議大量飲用葡萄柚汁。
4. Verapamil、Amiodarone： Verapamil 與 amiodarone 都已知會抑制 CYP3A4 的活性，與 atorvastatin 合併投予可能會導致 atorvastatin 的曝藥量升高。

注意事項： 1.本劑禁用於活動性肝病或 Transaminase 不明原因持續上升之患者。
2.建議在治療前及給藥治療後 12 週或增加劑量時，做肝功能檢查；此後每間隔半年監測肝功能一次。
3.應指導用藥患者，如果出現不明原因的肌肉疼痛、壓痛或肌肉無力，尤其是伴隨身體不適或發燒，必須立即告訴醫師。

懷 孕 期： 有生育能力的婦女只有在非常不可能懷孕，而且被告知其潛在危險的情況下，方可使用 Atorvastatin calcium。婦女若於服用 Atorvastatin calcium 期間懷孕，必須立即停藥，並且要再度被告知其對胎兒的潛在危險。

授 乳 期： 可能會使吃母乳的嬰兒產生不良反應，服用 Atorvastatin 的婦女不可授乳。