

Ufur

【OUFU】Ufur® 100mg/Cap

ATC Code : L01BC53

中文名：友復膠囊 «東洋»

適應症：胃癌、大腸癌、乳癌、結腸癌、頭頸部鱗狀上皮癌、與 cisplatin 並用治療轉移性及末期肺癌。

成分： Each cap contains:
Tegafur 100 mg
Uracil 224 mg

藥理分類： Antineoplastic Agents

用法用量： **Administration** : Orally, taken with a cup of water on an empty stomach.

Dosage regimen :

Based on tegafur, 300-600 mg/day (or 300-350 mg/m²/day) in 2-3 doses.

不良反應： 嘔吐、腹瀉、口內炎、食慾差、肝指數異常、色素沉澱。

注意事項： 1.空腹時(餐前 1 小時或餐後 1 小時)服用，並伴服一杯開水服用。
2.本品曾引起嚴重肝損害，如猛爆性肝炎，應嚴密觀察，定期檢查肝功能。發現有異狀時，應立即停藥並作適當處置。
3.正在服用 sorivudine 之患者禁用本品。

懷孕期： 孕婦或可能懷孕的婦女禁止使用。孕婦使用本劑，已有新生兒畸胎之報告。

授乳期： 授乳婦若必要服用本劑，應停止授乳。

使用規定： 全民健保給付規範：含 Tegafur 成分製劑

- 1.限轉移性胃癌、轉移性大腸癌、轉移性結腸癌、轉移性乳癌之病患使用。
- 2.以下疾病限行政院衛生署許可證已核准適應症之藥品(如 Ufur、UFT)
 - (1)頭頸部鱗狀上皮癌。
 - (2)與 Cisplatin 並用治療轉移及末期肺癌。
- 3.大腸癌、結腸癌第 II、III 期患者之術後輔助性治療，使用期限不得超過 2 年。