

Sultamicillin Tosylate

【OUNA】Unasyn[®] 375mg/Tab

ATC Code : J01CR04

中文名：優耐迅口服錠劑 <Pfizer>

適應症：鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、陰性變形桿菌屬、檸檬酸菌屬、厭氧性細菌(Bacteroides fusobacterium, Clostridium difficile)，Branhamella catarrhalis 引起之感染症。

藥理分類：Antibiotic, Penicillin.

用法用量：Adults,

Usual dose:

1 tablet BID-TID, or 1~2 Tablets BID.

Uncomplicated gonorrhoea:

single oral dose of 2.25 g (six 375 mg tablets).

Children and Infants:

< 30 kg:

25-50 mg/kg/day orally in two divided doses,
depending on the severity of the infection and the physician's judgement.

≥30 kg:

the usual adult dose should be given.

不良反應：噁心、嘔吐、腹瀉、偽膜性結腸炎、SGOT 與 SGPT 暫時性升高、黃疸、類過敏反應等。

注意事項：1.原則上依據藥物敏感性試驗結果，給予最短的療程，避免抗藥菌株之產生。
2.可隨食物或不隨食物服用此藥。若引起肚子不舒服則與食物一起服用。請以適量水一起服用，服藥後不要立即躺下，睡前服用需特別小心。
3.老年者及嚴重腎功能不佳者須謹慎使用。
4.病人口服進食有困難或正使用非胃腸道方式提供營養或病人衰弱者(可能出現維他命 K 缺乏的症狀)，這類病人需小心嚴密觀察。

交互作用：1. 抗凝血劑(如 Warfarin): 增加出血機會
2. 口服避孕藥: 降低避孕效果
3. Methotrexate: MTX 毒性增加

懷 孕 期：動物試驗顯示，高劑量 ampicillin 有致畸胎作用，當益處高於潛在風險時才使用此藥。

授 乳 期：Ampicillim 會分泌至乳汁，授乳婦使用此藥時應停止授乳。

備 註：Sultamicillin 為 ampicillin-sulbactam 之 prodrug。