

Silodosin

【OUR18】 Urief[®] 8mg/Tab

ATC Code : G04CA04

中文名： 優列扶膠囊 «健喬信元»

適應症： 前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙。

藥理分類： **Alpha 1 Blocker.**

用法用量： -Usual dosage:

PO, 8 mg QD with a meal.

-Renal Impairment

CrCl >50 mL/minute: No dosage adjustment necessary.

CrCl 30-50 mL/min: 2 mg BID or 4mg QD with a meal.

-Hepatic Impairment:

Child-Pugh A or B: No dosage adjustment necessary.

不良反應： 射精障礙、起身時暈眩、口渴、腹瀉、頭暈、搖晃感、鼻塞。

禁忌： 1. 嚴重腎功能障礙者(CrCl < 30 mL/min)禁用。
2. 嚴重肝功能障礙者(Child-Pugh score \geq 10)禁用。

交互作用：

1. Mainly metabolized by cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), UDP-glucuronosyltransferase, alcohol dehydrogenase, and aldehyde dehydrogenase.
2. **CYP3A4 inhibitor** (Ketoconazole, Clarithromycin, Itraconazole, Ritonavir; diltiazem, erythromycin, verapamil): \uparrow serum level of Silodosin.
3. Alpha1-Blockers may \downarrow the vasoconstricting effect of **Alpha1-Agonists**. Similarly, Alpha1-Agonists may \downarrow Alpha1-Blocker vasodilation.
4. Alpha1-Blockers may \uparrow the hypotensive effect of **Calcium Channel Blockers**.
5. Alpha1-Blockers (Uroselective) : \uparrow the hypotensive effect of **Phosphodiesterase 5 Inhibitors** (Avanafil, Mirodenafil, Sildenafil, Tadalafil, Udenafil, Vardenafil).

注意事項： 1. 本品不適用於女性、兒童。
2. 飯後(與食物一起)服用，以降低副作用產生的風險。
2. 變換姿勢(如:起床)要緩慢，以免跌倒。
3. 可能造成暈眩，駕駛及機械操作者須特別留意。

懷孕期： Urief[®] 不適用於女性。

懷孕期及哺乳期的老鼠投與 silodosin 300 mg/kg/day，皆未觀察到對其子代有外觀肢體及行為發展上有影響。

授乳期： Urief[®] 不適用於女性。

懷孕期及哺乳期的老鼠投與 silodosin 300 mg/kg/day，皆未觀察到對其子代有外觀肢體及行為發展上有影響。

給付規定： 全民健保藥品給付規定：限男性使用。