

Progesterone, Micronized

【OUTRP】Utrogestan (Promone®) 100mg/Soft Cap

ATC Code : G03DA04

中文名： 婦安蒙軟膠囊 «培力»

適應症： **口服途徑給藥：****婦科：**黃體素不足造成失調，主要為：經前症候群，因異常排卵或停止排卵引起的經期不規則。良性乳腺病，停經前期症狀。更年期治療（雌激素療法的輔助藥品）。黃體期障礙造成不孕。**產科：**預防黃體期障礙造成習慣性流產。**陰道途徑給藥：**因黃體期障礙引起初級或次級不孕（主要用於：排卵困難，做人工受孕或卵子捐贈時的黃體期補充。）預防黃體期障礙造成習慣性流產。

用法用量：

用法：

- 口服給藥：空腹或與食物一起服用皆可。
- 陰道途徑給藥：塞入陰道深處。

適應症與劑量：

- 口服給藥：
一日標準用量為 200 到 300mg，分 1 到 2 次服用,例如夜晚就寢前服用 200mg，必要時可在早晨服用 100mg。
- 陰道途徑給藥：
一天普通劑量 200mg，可使用給藥器。早晚從陰道深入塞進一顆 100mg 膠囊，可根據個別病患的反應提高劑量。

不良反應： 早於月經週期的第 15 天前給藥，則可能造成經期縮短或陰道出血。劑量過高，則可能發生昏睡、嗜睡。

注意事項： 1、本品不能用以防止懷孕及作為避孕藥使用。
2、停經病人使用 estrogen 治療時，建議每個週期至少應使用 10 天的 progesterone，以幫助病人獲得 estrogen 療法的全部好處。
3、嚴重肝功能障礙、對本產品任一成分過敏者不適合使用。

懷 孕 期： 包括剛懷孕的前幾周，使用本藥品並不會產生禁忌。

授 乳 期： 資料不足，哺乳期間應盡量避免使用。

儲 存： 於 25°C 以下儲存，避免冰凍。