

## 08:18.08.20 Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors

### Tenofovir Alafenamide

【OVEM】 Vemlidy® 25mg/Tab

ATC Code : J05AF13

中文名： 韋立得膜衣錠 «Gilead»

適應症： 適用於治療成人慢性 B 型肝炎。

藥理分類： **Antihepadnaviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HBV).**

用法用量： **Administration:** Orally, taken with food.

#### Dosage regimens:

Chronic Hepatitis B Virus (HBV) Infection:

- Adult & Child  $\geq$  18yrs:

1 Tab once daily.

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應： 頭痛、腹痛、疲倦、咳嗽、噁心、背痛

交互作用：

- **CARBAMAZEPINE, RIFAMPIN, RIFABUTIN, RIFAPENTINE, PHENOBARBITAL, PHENYTOIN, ST JOHNS WORT, : decreased** tenofovir alafenamide exposure, loss of therapeutic effect, and increased risk of resistance.
- **LEFLUNOMIDE: increased exposure of Vemlidy®.**

注意事項：

1. Vemlidy 不建議用於末期腎病且未接受長期血液透析的病人。
2. 於 CrCl  $\geq$  15 mL/minute 的病人，或末期腎病 (ESRD, CrCl < 15 mL/minute) 但接受長期血液透析的病人，並不須調整 VEMLIDY 的劑量。
3. 對肝功能不全的病人，並不須調整 VEMLIDY 的劑量。

**懷 孕 期：**現有的 APR 資料顯示，tenofovir alafenamide (TAF) 的整體出生缺陷風險和亞特蘭大大都會先天缺陷計劃 (MACDP) 中美國參考族群的重大出生缺陷背景發生率 (2.7%) 並無明顯差異。

**哺 乳 期：**目前並不確知 VEMLIDY 及其代謝物是否會出現於人類的乳汁中、影響乳汁生成作用或對餵哺母乳的嬰兒造成影響。

**使用規定：**用於慢性病毒性 B 型肝炎患者，詳細內容請參閱條文 10.7.3.及 10.7.4 (111/3/1)。