

Voriconazole

【OVFE】Vfend® Film-Coated Tablets 200mg

ATC Code : J02AC03

中文名： 微飛膜衣錠 200 毫克 «Pfizer»

適應症： 1.治療侵犯性麴菌病；2.治療嚴重之侵犯性念珠菌感染；3.治療足分枝菌和鐮刀菌之嚴重黴菌感染；4.預防高危險患者發生侵入性黴菌感染，包括接受造血幹細胞移植的患者。

藥理分類： Antifungal Agent, Azole Derivative; Antifungal Agent, Oral; Parenteral.

用法用量： 成人使用：

	口服	
	患者體重≥40 公斤	患者體重<40 公斤
所有適應症的負荷劑量療程(最初 24 小時)	每 12 小時 400 mg (最初 24 小時)	每 12 小時 200 mg (最初 24 小時)
維持劑量 (最初 24 小時之後)		
預防侵入性黴菌感染/ 預防突發性感染	每 12 小時 200 mg	每 12 小時 100 mg
對 fluconazole 具抗藥性之嚴重侵入性念珠菌/侵入性麴菌症/足分枝菌和鐮刀菌之嚴重黴菌感染	每 12 小時 200 mg	每 12 小時 100 mg
免疫系統受損患者由白色念珠菌引起的食道念珠菌病	每 12 小時 200 mg	每 12 小時 100 mg

劑量調整：

- 1.若患者對治療的反應不理想，可將口服維持劑量由每 12 小時 200 mg，增加到每 12 小時 300 mg。體重低於 40 公斤的患者，可由每 12 小時 100 mg 增加至 150 mg。
- 2.若患者無法忍受較高的劑量，則將口服劑量每次降低 50 mg，逐漸減少至每 12 小時 200 mg (體重低於 40 公斤的患者，則為每 12 小時 100 mg)的維持劑量。
- 3.如果 voriconazole 的維持劑量可以由每 12 小時口服 200 mg 增加至 400 mg (體重低於 40 公斤的患者，可以由每 12 小時口服 100 mg 增加至 200 mg)。

兒童使用：

	口服
負荷劑量療程 (最初 24 小時)	無建議
維持劑量 (最初 24 小時之後)	9 mg/kg BID (最高劑量為 350mg BID)

不良反應： 視覺障礙、發燒、出疹、嘔吐、噁心、腹瀉、頭痛、周邊水腫等情形。

交互作用： 1. Strong CYP3A4 inducer (Carbamazepine, phenobarbital, Rifabutin, Rifampicin, St. John's wort): ↓ voriconazole level, **contraindicated**.
2. Phenytoin: avoid coadministration or Increase voriconazole maintenance dose.
3. CYP3A4 substrate (Astemizole, cisapride, pimozone, quinidine, terfenadine): May prolong QTc.
4. Ergotamine, dihydroergotamine: ↑ Ergotamine, dihydroergotamine level , **contraindicated**.

注意事項： 在餐前 1 小時或餐後 1 小時服用此藥。服藥期間避免喝葡萄柚汁或吃葡萄柚。請做好防曬措施。

懷孕期： 不得於懷孕時使用，除非對母體的好處明顯超過對胎兒的潛在風險。

授乳期： 分泌至乳汁的狀況不明。哺乳婦女於開始使用本藥治療時必須停止哺乳。