

Sildenafil Citrate

【OVIA1】Viagra® 100mg/Tab

ATC Code : G04BE03

中文名：威而鋼膜衣錠 «Pfizer»

適應症：成年男性勃起功能障礙。

藥理分類：Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitor.

用法用量：Administration:

- Administer orally, no more than once daily.
- Administer about 1 hr (range 4 hrs to 30 mins) before sexual activity.
- Administration of the drug with a high-fat meal may delay the onset of action.

Dosage regimen:

Initially, 50 mg.

Depending on effectiveness and tolerance, increase dosage to a maximum of 100 mg or decrease to 25 mg.

Dosage adjustment for patients > 65 yrs, hepatic impairment (Cirrhosis), severe renal impairment ($\text{Clcr} < 30 \text{ mL/min}$), or concomitant use of potent CYP 3A4 inhibitors (erythromycin, ketoconazole, itraconazole):

25 mg once daily as needed 1 hour before sexual activity.

不良反應：頭痛、潮紅、消化不良、鼻塞、陰莖異常勃起、尿道感染、視覺異常、腹瀉、暈眩等。

交互作用：

- Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir): ↑ risk of sildenafil adverse effects (hypotension, syncope, visual changes, priapism).
※ **Ritonavir**: a protease inhibitor, a CYP3A inhibitor
- Nitroprusside, nitroglycerin, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate : ↑ hypotensive effects.
- Clarithromycin, fluconazole, itraconazole, voriconazole: ↑ sildenafil plasma concentrations.

注意事項：
1.服用硝酸鹽類藥品之病患，禁止服用本劑。
2.對於患有心臟病、陰莖結構變形、勃起異常、出血性疾病或活動性胃潰瘍、視網膜色素沈著症者應小心使用本劑。

懷孕期：
1.Viagra®並不適用於女性。
2.對於孕婦使用 sildenafil 並無足夠且經有效控制的研究。
3.動物試驗結果並無任何證據顯示有致畸胎的副作用，或對胚胎，胎兒有任何不良影響。

授乳期：Viagra®不適用於女性，目前並沒有任何有關其會分泌進入母乳中的資料。

備註：本品健保不給付。