

Doxycycline

【OVIB】 Doxymycin® 100mg/Cap

ATC Code : J01AA02

中文名：多喜黴素腸溶膠囊 «永信»

適應症：革蘭氏陽性菌、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

藥物特性：本藥為一腸溶微粒膠囊，在膠囊中的每一微粒均為腸溶劑型，可確保藥品安全的通過胃，而到達小腸才崩散，固可確保胃部不受藥品刺激。

藥理分類：Antibiotic, Tetracycline Derivative.

用法用量：Administration:

Administer without regard to meals; taken with food if gastric irritation occurs.

Swallow the whole capsules, do not crush or chew.

Probably should not be given at bedtime or to patients with esophageal obstruction or compression.

Dosage regimens:

— Adults & Children > 8yrs weighing >45kg:

100 mg Q12h on day 1 followed by 100 mg/day in 1 or 2 divided doses. For more severe infections, 100 mg Q12h.

— Children > 8 yrs weighing ≤ 45 kg:

4.4 mg/kg in 2 divided doses on day 1 followed by 2.2 mg/kg/day in 1 or 2 divided doses. For more severe infections, up to 4.4 mg/kg/day.

Dosing:

Kidney Impairment: Adult

- Mild to severe impairment: No dosage adjustment necessary.
- Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Poorly dialyzed (0% to 5%); no supplemental dose or dosage adjustment necessary.
- Peritoneal dialysis: Poorly dialyzed; no dosage adjustment necessary.

Hepatic Impairment: Adult

There are no dosage adjustments provided in the manufacturer's labeling.

不良反應：腸障礙、發熱、發疹、光敏感等。

- 注意事項：
1. 與牛奶一起服用會破壞本藥之腸溶特性，使藥品於胃不溶解，請勿與併用。
 2. 與牛奶或含鈣、鋁、鐵之製劑需相隔至少 2 小時，併用會減低本劑之吸收，降低藥效。
 3. 應整粒吞服，不宜研磨或咬碎，須與多量開水一起服用，且服藥後不要馬上躺下，以避免藥粒停留於食道，而引起食道潰瘍。
 4. 本劑不建議使用於 8 歲以下之兒童。

懷 孕 期：本藥會通過胎盤，可能影響胎兒骨骼發育。若臨床需要時，須謹慎使用。

授 乳 期：接受本藥治療期間應停止哺乳。