

Tenofovir Disoproxil Fumarate

【OVIP】 Viproof[®] 300mg/Tab

ATC Code : J05AF07

中文名： 惠立妥膜衣錠 «Patheon»

適應症： 1.用於慢性 B 型肝炎者。
2.與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用於成人 HIV-1 感染之治療。

藥理分類： **Antihepadnaviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HBV); Antiretroviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HIV).**

用法用量： **Administration:** Orally, without regard to meals.

Dosage regimens:

300mg once daily

— Dosage for adults with renal impairment:

Clcr(mL/min)	Dosage
≥ 50	300 mg QD
30-49	300 mg once 48 hrs
10-29	300 mg once 72-96 hrs
Hemodialysis	300 mg once every 7 days

不良反應： 癢癢、噁心、腹瀉、頭痛、抑鬱症、乳酸中毒、嚴重脂肪變性、肝腫大。

交互作用：

- NSAIDS: ↑ risk of acute renal failure.
- ORLISTAT: loss of virological control.
- PAXLOVID[®] (NIRMATRELVIR/RITONAVIR): ↑ tenofovir exposure.

注意事項： 1.若有噁心、嘔吐、腹痛及呼吸急促或黃疸、深色尿液和白色糞便等情況，請立即回診就醫。

2.停用本品後應遵照醫師指示監測肝功能。

懷 孕 期： 若有需要，可考慮於懷孕期間使用本藥。

授 乳 期： 1. 不建議 HIV 感染之母親哺乳。

2. In breastfeeding women with **hepatitis B infection (not coinfecting with HIV)**, the American Association for the Study of Liver Disease chronic hepatitis B treatment guidelines **do not consider antiviral therapy a contraindication to breastfeeding**; antivirals are minimally excreted in breast milk and unlikely to cause significant toxicity.

However, the unknown risk of low-level exposure to the infant should be discussed with mothers as well as the insufficient long-term safety data in infants born to mothers who took antiviral agents while breastfeeding.

3. ... females living with HIV infection should **completely avoid breastfeeding** to decrease the potential transmission of HIV (HHS [perinatal] 2019).

用藥規定： 限用於參加「全民健康保險加強慢性 B 型及 C 型肝炎治療試辦計畫」之下列慢性病毒性 B 型肝炎患者：經使用 lamivudine 治療出現抗藥株，且 ALT 值大於或等於正常值 2 倍者得使用，其給付療程為 24 個月。用於治療具有病毒複製及活動性肝臟發炎證據的成人慢性 B 型肝炎患者。

備 註： 本品健保處方限胃腸肝膽科醫師開立。