

Dienogest

【OVISA】Visanne (Visanne®) 2 mg tablet

ATC Code : G03DB08

中文名：異位寧 « Bayer »

適應症：治療子宮內膜異位症伴隨之骨盆腔疼痛。

藥理分類：Antiandrogen.

用法用量：Administration:

- Orally, administer preferably at the same time each day with liquid and without regard to meals.
- Tablets **should be taken continuously** regardless of any vaginal bleeding.
- If vomiting and/or diarrhea occur within 3 to 4 hours of administration, repeat dose.

Indications and Dosage regimens:

Endometriosis:

2 mg QD

不良反應：頭痛、乳房不適、噁心、體重增加。

交互作用：

- **Tranexamic Acid**: ↑ the thrombogenic effect of Tranexamic Acid.
- **CYP2C9 inducer** (Aprepitant, Fosaprepitant): ↓ the serum level of Dienogest.
- **CYP3A4 Inducers** (Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin, Rifampin; Rifabutin, Rifapentine, St John's Wort) : ↓ the serum level of Dienogest.
- **Topiramate**: ↓ the serum level of Dienogest.
- **Dienogest** may ↓ the therapeutic effect of **Antidiabetic Agents**.
- **CYP3A4 Inhibitors** (Clarithromycin, Itraconazole, Ketoconazole, Ritonavir) : ↑ the serum level of Dienogest.

注意事項：

1. 任何的荷爾蒙避孕法均必須在開始本藥治療前停用。
2. 若有避孕需要，應使用非荷爾蒙類的避孕方法(例如：阻隔式避孕)。
3. 可於月經週期的任一天開始服藥。每日一錠，持續不間斷，最好於每天同一時間服藥，並視需要搭配飲水。可於飯前或飯後服用。無論是否發生陰道出血，均必須連續服藥。當服完一份包裝的藥物後，應開始服用下一份藥物，不可中斷。
4. **漏服藥錠的處置方式**：如果漏服藥錠、嘔吐以及/或腹瀉(若發生於服藥後 3 小時 - 4 小時內)，可能會降低本藥的療效。若漏服藥錠，應於想起來時儘快服用一顆藥錠(僅可服用一顆)，並應於隔天依照平常的時間繼續服藥。如果因嘔吐或腹瀉而無法吸收藥錠，同樣也應補服一顆藥錠。

懷孕期：懷孕女性不應接受本藥的治療，因為懷孕期間不需要治療子宮內膜異位症。目前本藥用於懷孕女性的資料相當有限。動物試驗並未直接或間接的指出具生殖毒性的傷害。

授乳期：不建議於授乳期間接受本藥的治療。目前尚未得知本藥是否會分泌至人體乳汁中。動物資料顯示本藥成分會分泌至大鼠乳汁中。應將哺乳對嬰兒的益處及女性的治療效益納入考量，再決定是否要停止哺乳或停止本藥療法。