

Doxazosin Mesylate

【OXAD】 Xadosin[®] SR 4mg/Tab

ATC Code : C02CA04

中文名： 薩多心持續性藥效錠 «中國化學»

適應症： 高血壓、良性前列腺肥大。

藥理分類： Alpha 1 Blocker; Antihypertensive.

用法用量： **Administration:** orally taken in the morning or evening. Do not chew or crush.

Indications and Dosage regimens:

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Hypertension:

Initial, 4 mg QD; titrate at 3~4 weeks intervals based on response.

Maintenance, 4-8 mg once daily.

MAX dose: 8 mg/day.

Severe hepatic impairment (Child-Pugh class C): Use is **not** recommended.

Avoid use for hypertension treatment (alternative agents have superior risk-benefit profiles) in geriatrics.

不良反應： 頭痛、暈眩、有睡意、低血壓。

交互作用： 1. TAMSULOSIN, ALFUZOSIN: ↑ effects of alpha adrenergic blockade.
2. TADALAFIL: ↑ risk of hypotension.
3. BETA-ADRENERGIC BLOCKERS: ↑ hypotensive response to the first dose of the alpha blocker.
4. NIFEDIPINE: ↑ plasma concentration of nifedipine which may result in increased risk of hypotension.

注意事項： 5. 整粒吞服。請勿磨粉或嚼碎。
6. 空藥錠會由身體排出，若在糞便中發現無須驚慌。
7. 使用本藥初期可能會減弱患者駕駛及操作機械的能力。
8. 某些正在使用或曾使用 α 1 阻斷劑的患者在進行白內障手術時，會出現手術中虹膜鬆弛下垂徵候群(IFIS，一種小瞳孔徵候群的變異型)。因為在手術時IFIS可能會導致併發症，所以，患者在手術前應告知眼科手術醫師目前正在使用或曾使用 α 阻斷劑。

懷孕期： 1. 懷孕期間使用本藥的安全性尚未確立。所以，只有在醫師評估利大於弊時，孕婦方可使用本藥。
2. Doxazosin crosses the placenta (Versmissen 2016).
3. Agents other than doxazosin are more commonly used to treat hypertension in pregnancy (ACOG 203 2019; ESC [Regitz-Zagrosek 2018]).

授乳期： 1. 授乳期間使用本藥的安全性尚未確立。所以，只有在醫師評估利大於弊時，授乳婦女方可使用本藥。
2. Doxazosin is present in breast milk. (case report)
3. In general, breastfeeding is considered acceptable when the relative infant dose of a medication is <10% (Anderson 2016; Ito 2000).