

Alfuzosin HCl

【OXAT】 Xatral XL Tab 10mg

ATC Code : G04CA01

中文名： 扎特持續性藥效錠 «Sanofi»

適應症： 良性前列腺肥大

藥理分類： Alpha 1 Blocker

用法用量： **Administration:** Orally, immediately following a meal at the same time each day.
Swallow tablet whole; do not crush or chew.

Benign prostatic hyperplasia (BPH):

10 mg QD

Moderate or severe hepatic impairment, severe renal impairment (CrCl <30 mL/min):
contraindicated

不良反應： 暈眩、頭痛、疲倦

交互作用：

- Ritonavir: ↑ level of alfuzosin.
- AZITHROMYCIN, Clarithromycin, erythromycin: ↑ level of alfuzosin.
- Sildenafil, tadalafil, vardenafil: ↑ risk of orthostatic hypotensive effect.
- FLUCONAZOLE, ITRACONAZOLE , KETOCONAZOLE: ↑ level of alfuzosin.
- CISAPRIDE: ↑ risk of QT-interval prolongation.
- PAXLOVID® (NIRMATRELVIR/RITONAVIR): ↑ alfuzosin exposure.
- FLUOROQUINOLONES, IMIPRAMINE, PROPAFENONE, QUETIAPINE , SERTRALINE, SULPIRIDE, HYDROXYCHLOROQUINE, DONEPEZIL, DRONEDARONE: ↑ risk of QT-interval prolongation.

注意事項： 1.可能會造成暈眩，所以起床行動時要緩慢起身，勿直接下床，注意避免跌倒。
2.使用本藥之治療初期可能發生姿勢性低血壓，駕駛及機械操作者須特別留意。
3.此藥應整錠以足量的液體吞服，不可嚼碎、分割或磨碎。

懷孕期： 此藥不適用於女性。

授乳期： 此藥不適用於女性。