

Orlistat

【OXEN】Xenical® 120mg/Cap

ATC Code : A08AB01

中文名：羅鮮子膠囊 «Roche»

適應症：低卡路里飲食，適合肥胖病患的治療，包括有與肥胖相關危險因子之病患。

藥理分類：Lipase Inhibitor

用法用量：Administration:

- Orally, administer **during or up to 1 hour after** each main meal containing fat.
- Separate dose by **at least 2 hours** from multivitamin containing fat-soluble vitamins.
- Omit dose if a meal is missed or contains no fat.

**Dosage regimens:**

120 mg 3 times daily with each main meal containing fat.

No additional benefit with dosages > 120 mg 3 times daily.

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應：油斑（沾褲）、胃脹氣、急便、油便、排油、排便增加、腹痛、脹氣。

- 注意事項：
- 1.治療期間不得超過2年。
  - 2.若不進食或此餐不含脂肪時則可省略服用此藥。
  - 3.可能影響脂溶性維生素A、D、E、K的吸收。兩者服用時間需相隔至少2小時。
  - 4.若某一餐含脂量特別高時服用，則胃腸道的副作用會增加。
  - 5.建議主餐進行中或最遲進餐後1小時內服用。

懷 孕 期：動物實驗中並未發現 orlistat 有胚胎毒性或致畸胎效應。在無動物之致畸胎效應下，於人類中亦不預期有致畸胎的反應。然而，在缺少臨床數據下，並不建議懷孕時服用 Xenical®。

授 乳 期：尚無 orlistat 是否會分泌至人類乳汁的研究。哺乳時不應服用 Xenical®。

備 註：本品健保不給付，自費處方計價單位量為42粒。