

Pitavastatin Calcium

【OLIV】Livalo[®] 2mg/Tab

ATC Code : C10AA08

中文名：力清之膜衣錠 «台田»

【OZUL】Zulitor[®] 4mg/Tab

ATC Code : C10AA08

中文名：平脂膜衣錠 4 毫克 «友霖生技»

適應症：原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常。

藥理分類：**Antilipemic Agent, HMG-CoA Reductase Inhibitor.**

用法用量：**Administration:** orally, taken with or without meals.

Dosage regimen:

Primary hyperlipidemia and mixed dyslipidemia:

Initial: 2 mg QD; may be increased to maximum 4 mg QD.

Note: Doses should be individualized according to the baseline LDL-cholesterol levels, the recommended goal of therapy, and patient response; adjustments should be made at intervals of 4 weeks.

禁忌：1.活動性肝病者，包含有不明原因的肝轉胺酶持續上升者。
2.孕婦或可能懷孕的婦女。

交互作用：1.蛋白酶抑制劑、cyclosporine、gemfibrozil、Fenofibrate、niacin 或 erythromycin、fusidic acid：增加發生肌病的危險性。
2.紅麴類食品（紅麴含有天然的 statin）：↑體內 statin 含量，影響肝功能。
3. Coumarin 類抗凝血劑：會顯著的增加正在服用病人之 INR。
4. Erythromycin: ↑ the serum level of Pitavastatin, Max dose: 1mg QD.
5. Rifamycin Derivatives: ↑ the serum level of Pitavastatin, Max dose: 2mg QD.
(mechanism unknown, likely involved rifampin-mediated **inhibition of pitavastatin hepatic uptake** via SLCO1B1.)

不良反應：頭痛、頭暈、便秘、腹瀉、肌痛、虛弱。

注意事項：1.飯前或飯後服用均可。
2.如出現不明原因肌肉疼痛、無力或發燒,請立即告訴醫師。
3.不可與葡萄柚汁、紅麴類食品併用。
4. Pitavastatin 應慎用於大量飲酒的患者。若罹患活動性肝臟疾病(含肝轉胺酶因不明原因持續上升者)，應禁用 Pitavastatin。

懷孕期：禁用。

授乳期：禁用。由於 HMG-CoA 還原酶抑制劑可能造成哺乳中嬰兒的不良反應，因此如同其他的 HMG-CoA 還原酶抑制劑，禁止用於孕婦及授乳中的母親。

使用規定：1.參照「全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表」。
2.第一年應每 3-6 個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每 6-12 個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功能異常，橫紋肌溶解症。