

Pitavastatin Calcium

【OLIV】Livalo® 2mg/Tab

ATC Code : C10AA08

中文名：力清之膜衣錠 «台田»

【OZUL】Zulitor® 4mg/Tab

ATC Code : C10AA08

中文名：平脂膜衣錠 4 毫克 «友霖生技»

適應症：原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常。

藥理分類：**Antilipemic Agent, HMG-CoA Reductase Inhibitor.**

用法用量：**Administration:** orally, taken with or without meals.

Dosage regimen:

Primary hyperlipidemia and mixed dyslipidemia:

Initial: 2 mg ~4mg QD; Maximum daily dose: 4 mg QD.

Note: dosage adjustments should be made at intervals of 4 weeks.

用法用量：(仿單)

● 成人：

■ 1~2mg QD。

■ Max daily dose: 4mg

● 10 歲以上兒童家族性高膽固醇血症：

■ 1mg QD。

■ Max daily dose: 2mg

腎功能不全病人的投藥劑量

- 中、重度腎功能不全(CCr 分別為 30-59 及 15-29 mL/min/1.73 m²)及正接受血液透析的末期腎臟病人，Livalo 起始劑量應為每日一次 1mg，最高劑量為每日一次 2mg。

肝功能障礙病人的投藥劑量

- 成人：以每日 1mg 開始給藥，最大給藥量不超過每日 2mg。
- 兒童：每日給藥 1mg。

禁忌：1.活動性肝病患者，包含有不明原因的肝轉胺酶持續上升者。
2.孕婦或可能懷孕的婦女。

交互作用：1.蛋白酶抑制劑、cyclosporine、gemfibrozil、Fenofibrate、niacin 或 erythromycin、fusidic acid：增加發生肌病的危險性。
2.紅麴類食品(紅麴含有天然的 statin)：↑ 體內 statin 含量，影響肝功能。
3. Coumarin 類抗凝血劑：↑ INR。
4. Erythromycin: ↑ the serum level of Pitavastatin, Max dose: 1mg QD.
5. Rifamycin Derivatives: ↑ the serum level of Pitavastatin, Max dose: 2mg QD. (mechanism unknown, likely involved rifampin-mediated **inhibition of pitavastatin hepatic uptake** via SLCO1B1.)

不良反應：頭痛、頭暈、便秘、腹瀉、肌痛、虛弱。

注意事項：1. 飯前或飯後服用均可。
2. 如出現不明原因肌肉疼痛、無力或發燒,請立即告訴醫師。
3. 不可與葡萄柚汁、紅麴類食品併用。
4. 慎用於大量飲酒患者。活動性肝疾患者(含肝轉胺酶持續上升者)，應禁用。
5. 每日一次劑量超過 4mg 會增加罹患嚴重肌肉病變(myopathy)風險。
6. 用於未滿 10 歲兒童之安全性與有效性尚未確立。

懷孕期：禁用。

授乳期：禁用。由於 HMG-CoA 還原酶抑制劑可能造成哺乳中嬰兒的不良反應，因此如同其他的 HMG-CoA 還原酶抑制劑，禁止用於孕婦及授乳中的母親。