

Cetirizine

【OZYRS】Cetirizine® Oral Solution 1mg/mL, 60mL/Bot

ATC Code : R06AE07

中文名：勝克敏液 «晟德»

適應症：季節性鼻炎、結膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

藥理分類：Histamine H1 Antagonist, Second Generation; Piperazine Derivative.

用法用量：**Administration:** Orally without regard to food. May adjust time of administration for individual patient requirements.

**Indications and dosage regimens:**

**Adults:**

— **Seasonal/Perennial allergic rhinitis or Chronic idiopathic urticaria:**

5 or 10 mg QD, depending on symptom severity.

**Children:**

— **Seasonal allergic rhinitis:**

**2-5 yr:** 2.5 mg QD; maximum of 5 mg daily, as 2.5 mg Q12H.

**6-11 yr:** 5 or 10 mg QD.

**≥ 12 yr:** 5 mg Q12H.

— **Perennial allergic rhinitis or Chronic idiopathic urticaria:**

**6-23 months:**

2.5 mg QD; In children 12-23 months of age, maximum of 5 mg daily, given as 2.5 mg Q12H.

**2-5 yr:** 2.5 mg QD; maximum of 5 mg daily, as 2.5 mg Q12H.

**6-11 yr:** 5 or 10 mg QD.

**≥ 12 yr:** 5 mg Q12H.

**Special populations:**

— Patients < 6 yrs with impaired renal or hepatic function: use not recommended.

— Patients ≥ 6 yrs with  $\text{Clcr} \leq 31 \text{ mL/min}$  or hepatic impairment: 5 mg QD.

— Geriatric ( ≥ 77 yrs): 5 mg QD .

不良反應：口乾、頭痛、嗜睡、疲倦。

懷 孕 期：動物實驗中，尚無引起不良反應之報告。但孕婦應避免使用本藥。

授 乳 期：本品會分泌至母乳中，不建議授乳婦使用。

使用規定：全民健保藥品給付規定－內服液劑之使用原則：

1、12 歲(含)以下兒童得使用內服液劑。

2、施行管灌飲食等不適合服用錠劑之病人，得依病情需要使用內服液劑。