

## Sevoflurane

【T1ULT】Ultane (Ultane<sup>®</sup>) 250mL/Bot

ATC Code : N01AB08

中文名：“英國廠”西福銳吸入用液劑《AESICA》

適應症：吸入性全身麻醉劑。

用法用量：**Anesthesia:** Inhalation:

Surgical levels of anesthesia are generally achieved with concentrations from 0.5% to 3% with or without the concomitant use of nitrous oxide; the concentration at which amnesia and loss of awareness occur is 0.6% (Katoh, 1998).

MAC values for surgical levels of anesthesia:

25 years:

Sevoflurane in oxygen: 2.6%

Sevoflurane in 65% N2O/35% oxygen: 1.4%

40 years:

Sevoflurane in oxygen: 2.1%

Sevoflurane in 65% N2O/35% oxygen: 1.1%

60 years:

Sevoflurane in oxygen: 1.7%

Sevoflurane in 65% N2O/35% oxygen: 0.9%

80 years:

Sevoflurane in oxygen: 1.4%

Sevoflurane in 65% N2O/35% oxygen: 0.7%

禁 忌：**Sevoflurane 不應用於已知或懷疑在基因上可能透發惡性體溫過高。Sevoflurane 不應用於已知對 sevoflurane 或其它鹵化吸入性麻醉劑敏感的病患(如，有肝毒性病史，通常包括肝臟酵素升高、發燒、白血球增多和/或與使用麻醉劑有關的短暫嗜伊紅血球增加)。**

懷孕期：**並無適當且控制良好之研究；除非明顯需要，否則不應於懷孕期間使用。**

授乳期：**Sevoflurane 或它的代謝物是否會分泌到乳汁中並不清楚。由於尚未有使用在授乳婦女的經驗，授乳婦女在投與 sevoflurane 後 48 小時內不應授乳，且應將此期間的母乳丟棄。**