

Chlorhexidine

【T2HIBI】 Antigerm solution 40mg/mL, 5000mL/Bot

ATC Code : D08AC02

中文名： 抑平菌殺菌液 《寶齡富錦》

適應症： 一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

藥理分類： Antibiotic, Topical.

用法用量： 主成份：Chlorhexidine gluconate 4.0 % (40mg/mL)

手術前手部消毒：

濕潤手部及前臂，取 5ml 抑平菌殺菌液洗 3 分鐘，指甲部位以刷子或刮刀清潔，然後徹底沖洗。再取 5ml 抑平菌殺菌液洗重複一次，然後徹底沖洗並以消毒手巾擦乾。

病房內之手部消毒：

濕潤手部及前臂，取 5ml 抑平菌殺菌液洗一分鐘，然後徹底沖洗。

手術前皮膚消毒：

取本品適量已消毒海綿塗擦於欲消毒部位，停留 2 分鐘後，以消毒手巾擦乾。重複前述步驟一次。以清水潤濕頭髮及皮膚後，取 25mL 本品清洗，再以清水沖除之，重複前述步驟一次。

皮膚創傷及一般皮膚消毒：

以清水潤濕患部後，取適量本品清洗，再以清水沖除之。重複前述步驟一次。若傷口深或皮膚深處，不適用本品。

個人居家清潔：

以溫水潤濕手部後，取 5ml 抑平菌殺菌清潔 15 秒，再以清水沖洗後擦乾。

不良反應： 皮膚炎，過敏反應(皮癢，紅斑，濕疹，疹子)，蕁麻疹，皮膚刺激及。

注意事項： 1. 僅供外用不能注射。不可用於體內。
2. 使用後請勿覆蓋。
3. 常見的漂白劑(含低氯酸鹽)可能會造成與本品接觸之布料產生棕色的污點。
4. 本品與肥皂或其他清潔劑併用會減低效力。

保 存： 儲存溫度不高於室溫(25°C)。