

Acyclovir

【TACYC】 Aclovir® Cream 5% 50mg/g, 5g/Tube

ATC Code : D06BB03

中文名：艾剋樂芙乳膏 «杏輝»

適應症：單純皰疹病毒引起之感染。

藥理分類：Antiviral Agent, Topical.

用法用量：Apply 5 times daily (≡ Q4H) for 5 days. Omit night-time dose. If healing has not occurred, treatment may be continued for up to 10 days.

不良反應：短暫灼熱感或刺痛、紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落。

注意事項：本劑型不建議使用於黏膜（如口、眼及陰道）。

懷 孕 期：1. acyclovir 會通過胎盤。雖然外用後吸收的量遠低於口服吸收的量，仍須小心使用。若塗抹於胸部附近，不建議哺乳。

2. Acyclovir is recommended for the treatment of genital herpes in pregnant patients (ACOG 2007; CDC [Workowski 2015]).

授 乳 期：1. Acyclovir 會分泌至乳汁中。雖然外用後吸收的量遠低於口服吸收的量，仍須小心使用。若塗抹於胸部附近，不建議哺乳。

2. Acyclovir is considered compatible with breastfeeding (WHO 2002). Acyclovir may be used for the treatment of genital herpes in breastfeeding women (ACOG 2007; CDC [Workowski 2015]).

給付規定： **全民健保藥品給付規定：

1、被保險人使用本類製劑應以下列適應症為限：

(1) 皰疹性腦炎。

(2) 帶狀皰疹或單純性皰疹侵犯三叉神經第一分枝 VI 皮節，可能危及眼角膜者。

(3) 帶狀皰疹或單純性皰疹侵犯薦椎 S2 皮節，將影響排泄功能者。

(4) 免疫機能不全、癌症、器官移植等病患之感染帶狀皰疹或單純性皰疹者。

(5) 新生兒或免疫機能不全患者的水痘感染。

(6) 罹患水痘，合併高燒（口溫 38 °C 以上）及肺炎（需 X 光顯示）或腦膜炎，並須住院者。

(7) 帶狀皰疹或單純性皰疹所引起之角膜炎或角膜潰瘍者。

(8) 急性視網膜壞死症（Acute retina necrosis）。

(9) 帶狀皰疹發疹 3 日內且感染部位在頭頸部、生殖器周圍之病人，可給予 5 日內之口服或外用藥品。

(10) 骨髓移植術後病患得依下列規定預防性使用 acyclovir：

限接受異體骨髓移植病患。

接受高劑量化療或全身放射治療（TBI）前 1 天至移植術後第 30 天為止。

2、使用療程原則以 10 天為限，皰疹性腦炎得使用 14 至 21 天，口服、注射劑及外用藥膏擇一使用，不得合併使用。

3、其他廠牌同成分藥品比照辦理。