

Testosterone

【TAND】 Androgel® Gel 50mg/Sachet, 30Sachet/Box

ATC Code : G03BA03

中文名： 昂斯妥凝膠 «友華生技»

適應症： 經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症（hypogonadism）的替代治療。

藥理分類： Androgen.

用法用量：Administration：

- 撕開包裝後，將藥品完全擠出於手掌心，並立即塗抹於肩部、手臂和/或腹部。等待數分鐘後，凝膠塗抹處會自然乾燥。
- 每小包有 5 公克凝膠，含有 50 毫克 Testosterone。

Dosage range:

50 to 100 mg daily.

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.

不良反應： 塗抹部位刺激感、痤瘡、男性女乳症、口腔刺激不適感、頭痛等。
如有以下症狀請立即就醫：手足或腳踝腫脹、呼吸困難、噁心、噁心嘔吐、皮膚或眼睛變黃、小便困難等。

- 注意事項：
- 1.一天一次於相用時間使用，以早晨為佳。
 - 2.請塗抹於乾淨、乾燥且無傷口之肩部、上臂及腹部皮膚。不可將 Androgel 直接塗抹於生殖器。
 - 3.塗抹後須靜待數分鐘至塗抹部位乾燥後再著衣。
 - 4.塗抹前後必須需以肥皂及清水清洗雙手。
 - 5.不使用 androgel 卻碰觸者，需立即以肥皂及清水清洗雙手。
 - 6.下列患者不得使用：患有乳癌及已知或懷疑有攝護腺癌的男性、對睪固酮或凝膠內其他任何成份過敏者。
 - 7.使用 Androgel 可能導致有或無鬱血性心臟衰竭之水腫的嚴重併發症，患有
心、腎或肝疾病者應立刻停藥。
 - 8.孕婦與哺乳婦不得碰觸本品，若碰觸，需立即以肥皂及清水清洗雙手。

孕婦與哺乳婦： 不得碰觸本品