

Umeclidinium bromide, Vilanterol trifenate

【TANO】Anoro® Ellipta inhalation Powder 30doses/box ATC Code : R03AL03

中文名：安肺樂易利達 55/22 mcg 乾粉吸入劑 « GSK »

主要成分：Umeclidinium bromide: 55mg (an anticholinergic)

Vilanterol trifenate: 22mg (a long-acting beta2-adrenergic agonist, LABA)

適應症：慢性阻塞性肺病(COPD)患者之氣道阻塞症狀的維持治療。

藥理分類：Long-Acting Anticholinergic Agent; Long-Acting Beta₂ Agonist.

用法用量：**Administration:** For oral inhalation only.

Indication and dosage:

Maintenance treatment of COPD: 1 inhalation of Anoro® Ellipta once daily.

Note:

- (1) Should be used at the same time every day.
- (2) Do not use Anoro® Ellipta more than 1 time every 24 hours.
- (3) No dosage adjustment is required for geriatric patients, patients with renal impairment, or patients with moderate hepatic impairment.

不良反應：咽喉炎，腹瀉或便秘、口乾、消化不良、腹痛。

交互作用：

- **P450 3A4 inhibitors**^{*}: may cause cardiovascular effects,
- **MAOI and TCA**: may ↑ effect of vilanterol on cardiovascular system,
- **Beta-blockers**: may block bronchodilatory effects of beta-agonists and produce severe bronchospasm,
- **Anticholinergics**: may interact additively.

^{*}**P450 3A4 inhibitors**: e.g., ketoconazole, itraconazole, voriconazole, ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, clarithromycin, troleandomycin, telithromycin.

注意事項：

- 1.吸口蓋打開即已上藥。確定使用前才打開吸口蓋。
- 2.如果您將吸口蓋打開再關上，但又未吸入藥物，將會浪費掉該劑藥物。該劑浪費掉的藥物會被密封在吸入器內部，但沒辦法再供使用。
- 3.自鋁箔藥盒取出後可以保存 6 週。

懷孕期：目前並無任何適當且控制良好的對孕婦使用 Anoro® Ellipta 或其個別成分 (umeclidinium 與 vilanterol)的試驗。只有在潛在效益超越胎兒可能面臨之風險的情況下，才可於懷孕期間使用。

授乳期：目前並不確知 Anoro® Ellipta 是否會分泌進入人類的乳汁。由於許多藥物都會分泌進入人類的乳汁，因此，對授乳母親投予 Anoro® Ellipta 時應謹慎。由於目前在授乳母親使用 Anoro® Ellipta 方面並無任何控制良好之人體試驗的資料，因此，應根據個別成分的資料，並考慮 Anoro® Ellipta 對母親的重要性，然後做出是要停止授乳還是停用 Anoro® Ellipta 的決定。