

Atropine Sulfate

【TATRO】Atropine® 0.01% Eye Drops 0.5mL/Amp

ATC Code : S01FA01

中文名： 亞妥明眼藥水 0.01% 《麥迪森醫藥》

適應症： 散瞳、睫狀肌麻痺。

藥理分類： Anticholinergic Agent, Ophthalmic; Ophthalmic Agent, Mydriatic.

用法用量： 1-2 drops of 0.01% ophthalmic solution in the eye 1 ~ 4 times daily.

不良反應： 眼睛刺痛、視力模糊、紅腫、癢、畏光、眼壓上升、口乾、心跳過快或頭痛。

注意事項： 1.本劑禁用於青光眼之患者（對於狹角性青光眼的病人若使用 anticholinergic 及 adrenergic mydriatics 可能會導致急性的閉角性青光眼）。
2.使用本劑後會視力模糊，應避免從事駕駛或具危險性之機械操作。
3.本藥品不含防腐劑，開瓶後需 24 小時內使用完畢。
4.小孩或對本品特定成分過敏者須小心使用。

懷 孕 期： 1.本品還未做動物生殖研究，也不知道是否能夠造成胎兒傷害。
2.本品僅當明確需要時才可應用於孕婦。
3. Atropine crosses the placenta following systemic maternal use (Shutt 1979).
4. Atropine is systemically available following ophthalmic administration.
5. If ophthalmic agents are needed during pregnancy, the minimum effective dose should be used in combination with punctual occlusion to decrease potential exposure to the fetus (Samples 1988).

授 乳 期： It is not known if atropine is excreted in breast milk following ophthalmic administration; however, systemic absorption occurs.

儲 存： 請置於 25 °C 以下冷暗處儲存，避免陽光及日光燈照射。