

Ipratropium Bromide

【TATRV】Atrovent® Nebuliser Solution UDV's 0.5mg/2mL/Vial

ATC Code : R03BB01

中文名：定喘樂單一劑量吸入液 «百靈佳般格翰»

適應症：慢性阻塞性支氣管炎、支氣管氣喘。

藥理分類：Anticholinergic Agent

用法用量：**Administration:** The unit dose vials are intended only for inhalation with suitable nebulizer and should not be taken orally.

Dosage regimen:

Adults & children ≥ 12 yrs:

1-2 mL (0.25-0.5 mg) Q6-8h.

Children 5-12 yrs:

0.5-1 mL (0.125-0.25 mg) Q4-6h.

不良反應：頭痛、噁心、咳嗽、口乾、味覺改變、排尿困難。

注意事項：

- 由於單一劑量吸入液不含保存劑，開封後應立即使用；每次投與時應使用新的小瓶以免微生物污染。
- 每 1 毫升的單一劑量可用生理食鹽水稀釋至 2-4 毫升或與 Berotec 吸入溶液併用。
- 定喘樂吸入液可經由市面上的噴霧裝置投與。如用有壁式氧氣時，投予本溶液流速最好是 6-8 公升/分鐘。
- Atrovent 吸入液可同時與祛痰劑 Mucosolvan 吸入液、Bisolvon 吸入液或 Berotec 吸入液使用。
- Atrovent 單一劑量吸入液不可與 disodium cromoglycate 吸入液加在相同的噴霧裝置內使用。

懷 孕 期：人類懷孕期間使用 Atrovent®的安全性仍未建立。已確定或可能懷孕的病患使用 Atrovent®時，需考量使用益處及其對未出生嬰兒可能造成的損害。

授 乳 期：Ipratropium bromide 尚未知是否會進入乳汁，雖然 ipratropium bromide 不太可能在嬰兒體內達到具顯著作用的強度，特別是當採噴霧劑方式給藥時亦如此。然而，授乳婦女應小心使用 Atrovent®。