

Fluticasone Furoate

【TAVA】 Avamys[®] Nasal Spray 27.5mcg/Spray, 120Sprays/Bot

ATC Code : R01AD12

中文名：艾敏釋鼻用噴液懸浮劑 «GSK»

適應症：治療 2 歲以上的兒童、青少年與成人的過敏性鼻炎。

藥理分類：Corticosteroid, Nasal

用法用量：**Administration: For intranasal use.**

Dosage regimens:

Rhinitis:

Adult & Children ≥ 12 years:

2 sprays in each nostril once daily. Total daily dosage should not exceed 2 sprays in each nostril (110 mcg/day).

Children 2-11 years:

- **Initial:** 1 spray (27.5 mcg/spray) per nostril once daily (55 mcg/day);
- patients not adequately responding may use 2 sprays per nostril once daily (110 mcg/day); once symptoms are controlled, dosage should be reduced to 1 spray per nostril once daily (55 mcg/day).
- Total daily dosage should not exceed 2 sprays in each nostril (110 mcg/day).

不良反應：鼻和喉嚨感覺乾燥和刺激，有不適的味道和氣味。頭痛、鼻出血、咽喉痛。

- 注意事項：
- 1.第一次使用前須先搖勻，並避開臉部對空測試按壓 6 次。
 - 2.若超過 30 天未使用或 5 天以上未加蓋，則須測試按壓直到均勻霧氣噴出。
 - 3.每次使用前均須充分搖勻。
 - 4.由於皮質類固醇對傷口癒合的抑制作用，近期內曾有鼻潰瘍、鼻手術或鼻外傷的患者在傷口癒合前不應使用艾敏釋鼻噴劑。
 - 5.鼻用及吸入劑型的皮質類固醇可能會導致青光眼及/或白內障的發生。對於視力改變或曾有眼內壓升高、青光眼及/或白內障病史的患者，應密切觀察。
 - 6.皮質類固醇使用於兒童患者時，可能會減緩成長速度。對接受艾敏釋鼻噴劑治療的兒童患者應定期監測其成長。
 - 7.患者應規律地每天使用一次艾敏釋鼻噴劑以達最佳效果。
季節性過敏性鼻炎通常可在 24 小時內，經年性過敏性鼻炎可在 4 天內有顯著改善，但要達到最佳效果仍可能需要幾天的時間。

懷 孕 期：針對懷孕婦女，目前仍無足夠控制良好的試驗。艾敏釋鼻噴劑僅有在證明可能的益處大於對胎兒可能的影響時，才可在懷孕時使用。

授 乳 期：尚不知道 fluticasone furoate 是否會分泌至乳汁。然而，其他的皮質類固醇曾在乳汁中被偵測。因目前仍無針對哺乳中母親鼻內給予 fluticasone furoate 的控制性試驗資料，哺乳中母親使用艾敏釋(Avamys)鼻噴劑時需謹慎。

儲 存：於 30°C 以下儲存，勿冷藏或冷凍。