

Azarga (Brinzolamide, Timolol)

【TAZA】Azarga® Eye drops, suspension 5ml/Bot

ATC Code : S01ED51

中文名：愛爾康複方愛舒壓懸浮液 «愛爾康»

適應症：用於治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。

藥理分類：Timolol: Nonselective Beta-Blocker; Brinzolamide: Carbonic Anhydrase Inhibitor; Ophthalmic Agent, Antiglaucoma.

成分：Each mL contains:

Brinzolamide HCl 10 mg

Timolol maleate (eq. to Timolol 5 mg)

用法用量：Safety and effectiveness not established in children (< 18 yrs).

Administration: Ophthalmic: For topical ophthalmic use only.

Dosage:

Instill 1 drop to the affected eye(s) 2 times daily.

不良反應：味覺障礙、視力模糊、眼睛疼痛、眼睛刺激感、眼睛有異物感。

注意事項：

1. 使用前請搖勻。
2. 患眼使用劑量，每眼每次不得超過一滴。
3. 開封以後 4 週即丟棄不用。
4. 點藥期間不要戴隱形眼鏡，給藥 15 分鐘後再重新戴上。
5. 建議點藥後壓住鼻淚管使其閉合或輕輕閉眼，可降低藥物經由眼睛吸收至全身的比率，以減少全身性副作用的產生。

禁忌：

1. 對本品的有效成分或任何賦形劑過敏者。
2. 支氣管氣喘、曾有支氣管氣喘病史或嚴重慢性阻塞性肺病。
3. 竇心跳除緩、二或三級房室阻斷、心衰竭或心源性休克。
4. 重度過敏性鼻炎及支氣管反應過度、對其他 β 阻斷劑過敏。
5. 高血氯性酸中毒。
6. 重度腎功能不全。
7. 對磺胺劑(sulfonamide)類藥物過敏。

懷 孕 期：只有在效益高於對胎兒的潛在傷害時，方可將 Azarga®點眼液用於懷孕婦女。

授 乳 期：Brinzolamide 是否會被排至人類乳汁中，尚未知；Timolol maleate 則會出現於人類乳汁中。基於藥物對母體重要性之考慮，應在停止哺乳與停止用藥，擇一而為。

儲 存：30 °C 以下避光。