Brinzolamide

【TAZO】Azopt® Sterile Oph. Suspension 1% 5mL/Bot

ATC Code : S01EC04

中文名：愛舒壓點眼懸液劑 «愛爾康»

適應症：高眼壓症及隅角開放性青光眼之患者。

藥理分類：Carbonic Anhydrase Inhibitor; Ophthalmic Agent, Antiglaucoma.

用法用量：**Administration: Ophthalmic: For topical ophthalmic use only.**

Dosage:

Instill 1 drop to the affected eye(s) BID-TID.

不良反應：眼睛灼熱感、針刺感、紅腫、異物感、畏光、視力模糊或苦味、頭痛、噁心。

注意事項：

1. 使用前請充分振搖。
2. 開瓶 4 週後請勿繼續使用。
3. 本品對 18 歲以下患者，其有效性與安全性尚未確立。
4. 點藥期間不要戴隱形眼鏡，給藥 15 分鐘後再重新戴上。
5. 建議點藥後壓住鼻淚管使其閉合或輕輕閉眼，可降低藥物經由眼睛吸收至全身的比率，以減少全身性副作用的產生。

禁忌：

1. 對本品的有效成分或任何賦形劑過敏者。
2. 重度腎功能不全。
3. 高血氣性酸中毒。
4. 對磺胺劑(sulfonamide)類藥物過敏。

懷 孕 期：只有在潛在效益高於對胎兒的潛在傷害時，方可將 Azopt®點眼液用於孕婦。

授 乳 期：尚未知 Brinzolamide 是否會被排至人類乳汁中。哺乳期建議避免使用本品。