

Clobetasol Propionate

【TBELC】Belolin 0.05% Cream 10g/Tube

ATC Code : D07AD01

中文名：倍絡宜乳膏 0.5 毫克／公克 《中生生技》

適應症：生皮癬、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡、濕疹。

藥理分類：Corticosteroid, Topical.

用法用量：1-2 times daily.

不良反應：搔癢、局部皮膚灼熱感／皮膚疼痛。

注意事項：1. 必要時(如肘、膝處之牛皮癬厚斑)可以 PE 膜覆蓋於塗藥處以增強作用。
2. 勿用於 1 歲以下兒童之皮膚疾患，包括皮膚炎及尿布疹。

懷 孕 期：1.Clobetasol 用於孕婦的資料有限。懷孕動物局部使用皮質類固醇，會造成胚胎發育異常。此發現對於人類的重要性仍未確立。
2.僅在預期對於母親的效益大於對胎兒的風險時，才可考慮對孕婦 使用 clobetasol。應盡量減少用量並縮短療程。

授 乳 期：授乳期間使用局部皮質類固醇的安全性仍未確立。目前還不清楚局部使用皮質類固醇的全身吸收量是否足以在母乳中產生可偵測的濃度。僅在預期對於母親的效益大於對嬰兒的風險時，才可考慮於懷孕期間使用 clobetasol。若需於哺乳期間使用 clobetasol，不可塗抹於乳房，以免嬰兒誤食。