

## Betaxolol

【TBETO】Betoptic® S Sterile Oph. Susp. 0.25% 5 mL/Bot

ATC Code : S01ED02

中文名：貝特舒眼用懸浮液 «Alcon»

適應症：慢性開放性隅角青光眼。

藥性簡述：Competitively blocks beta<sub>1</sub>-receptors, with little or no effect on beta<sub>2</sub>-receptors; with ophthalmic use, reduces intraocular pressure by reducing the production of aqueous humor.

藥理分類：Selective **beta<sub>1</sub>** antagonist and with weak membrane-stabilizing activity. Ophthalmic Agent, Antiglaucoma.

用法用量：Instill 1~2 drops in affected eye(s) 2 times daily.

Safety and effectiveness not established in pediatric patients

不良反應：視力模糊、點狀角膜炎、異物感、畏光、流淚、眼睛癢、眼睛乾燥、紅斑、發炎、分泌物增加、眼痛、視力降低和睫毛鱗屑。

注意事項：1.使用前將藥水搖晃均勻。  
2.第1次開封後28天，請將剩餘藥品丟棄。  
3.建議點藥後壓住鼻淚管使其閉合或輕輕閤眼，可降低藥物經由眼睛吸收至全身的比率，以減少全身性副作用的產生。

禁忌：1.患有竇性心跳減慢症。  
2.一級以上房室傳導阻滯。  
3.心臟性休克。  
4.明顯心臟衰竭之病人。  
5.對本藥任一成份過敏者。

懷孕期：在懷孕婦女並沒有適當及控制良好之研究報告，因此除非有必要，否則本藥不建議使用於孕婦。

授乳期：尚未證實 betaxolol HCl 是否會經乳汁排泄。因為很多藥物服用後都會經由乳汁排泄，所以哺乳之婦女在使用本藥時要多加留意。

健保規定：多次使用包裝(規格量≥2.5mL)，單眼每四週處方為一瓶，雙眼得每二週或三週處方一瓶。