

Povidone Iodine

【T2POV5】 Sindine Alcoholic Sol.® 500mL

ATC Code : D08AG02

【T2POVL】 Sindine Alcoholic Sol.® 3800mL/桶

ATC Code : D08AG02

中文名： 金碘酒精液 «杏輝»

適應症： 傷口消毒。

【TBIAQ】 Sindine Aqueous Sol.® 120mL/Bot

ATC Code : D08AG02

【T2POVQ】 Sindine Aqueous Sol.® 3800mL/桶

ATC Code : D08AG02

中文名： 金碘藥水 «杏輝»

適應症： 傷口消毒。

成分： Povidone-Iodine 100 mg/mL

藥理分類： Anti-infectives, Miscellaneous.

用法用量： Apply 1-4 times daily

不良反應： 皮膚或衣物染色。

懷 孕 期： 1. 反覆使用可能使孕婦及新生兒出現甲狀腺腫及功能低下。
2. Povidine-iodine is absorbed systemically as iodine following topical administration to the vaginal mucosa (Velasco 2009; Vorherr 1980).
3. Transient hypothyroidism in the newborn has been reported following topical use prior to delivery (Danziger 1987).

授 乳 期： 1. 反覆使用可能使哺乳婦及新生兒出現甲狀腺腫及功能低下。
2. Iodine can be detected in breast milk following topical application of povidone-iodine (Koga 1995).

儲 存： 本劑須置於密閉容器內避光儲存。