

Benzydamine

【TCOMF】 Comfflam® Forte Throat Spray 0.3% 30 mL/Bot *ATC Code : M01AX07*

中文名： 康護寧加強消炎噴液劑 «倍斯特»

適應症： 舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

藥理分類： Anti-inflammatory, Locally Applied; Local Anesthetic, Oral. (NSAID; inhibits production of proinflammatory cytokines to reduce local pain and inflammation. Also has local anesthetic activity.)

用法用量： **Administration:** throat spray.

Indications and dosage regimen:

- > 12 yrs, 2-4 puffs; the dose may be repeated within 1.5-3 hr, if necessary.
- 6-12 yrs, 2 puffs; the dose may be repeated within 1.5-3 hr, if necessary.

Safety and efficacy not established in children

不良反應： 口腔的麻木感、噁心、嘔吐、反胃。

注意事項：

1. 於喉嚨噴液後緩慢吞服。
2. 對 Benzydamine 或本藥其他成份過敏、肝或腎臟功能不全患者應小心使用。
3. 本品不建議使用在六歲以下孩童。
4. 除非在醫師指示之下，連續治療不應超過 7 天。
5. 使用後，用乾淨的面紙擦乾噴嘴以避免阻塞。

懷 孕 期：

1. 孕婦使用前應評估其效益及潛在危險性。
2. Adverse effects were observed in animal reproduction studies. Safety has not been established in pregnant women.

授 乳 期： It is not known if benzydamine is excreted in breast milk.