

Benzylamine

【TDIFI】 Diffiam® Forte Throat Spray 0.3% 15 mL/Bot *ATC Code : M01AX07*

中文名： 得伏寧加強消炎噴液劑 «裕利»

適應症： 舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

藥理分類： Anti-inflammatory, Locally Applied; Local Anesthetic, Oral. (NSAID; inhibits production of proinflammatory cytokines to reduce local pain and inflammation. Also has local anesthetic activity.)

用法用量： **Administration:** throat spray.

Indications and dosage regimen:

- 成人或年齡大於 12 歲的小孩：直接噴液 2-4 次(1-2 毫克)於疼痛紅腫部位後緩慢吞服。如有必要每 1.5-3 小時可重複使用。
- 6-12 歲的小孩：直接噴液 2 次 (1 毫克) 於疼痛紅腫部位後緩慢吞服。如有必要每 1.5-3 小時可重複使用。
- 6 歲以下孩童：不建議使用。
- 除非在醫師指示之下，連續治療不應超過 7 天。

不良反應： 口腔的麻木感、噁心、嘔吐、反胃。

注意事項： 1. 於喉嚨噴液後緩慢吞服。
2. 對 Benzylamine 或本藥其他成份過敏、肝或腎臟功能不全患者應小心使用。
3. 除非在醫師指示之下，連續治療不應超過 7 天。
4. 使用後，用乾淨的面紙擦乾噴嘴以避免阻塞。

懷 孕 期： 1. 安全性尚未建立，孕婦使用本品前，須評估其效益性及其潛在的危險性。
2. Adverse effects were observed in animal reproduction studies. Safety has not been established in pregnant women.

授 乳 期： It is not known if benzylamine is excreted in breast milk.