

Salicylic acid 16.7%(w/w), Lactic acid 15%(w/w)

【TDOU】 Duofilm Solution 15mL/Bot

ATC Code : D01AE20

中文名： 治疣液 «臺灣史帝富»

適應症： 除疣劑。

主成分： Salicylic acid 16.7%, Lactic acid 15%

藥理分類： Keratolytic Agents.

用法用量： 成人及 2 歲以上：

1. 只能外用於皮膚，直接使用於疣的部位，勿塗於疣周圍之正常皮膚。
2. 使用前先以熱水浸泡疣之部位至少 5 分鐘，並用浮石或銼刀輕輕磨去多餘角質，再用乾毛巾擦乾。
3. 使用所附之刷子滴 2-4 滴於疣之部位，每天一次。
4. 滴第 2 滴前，必須等前 1 滴乾後才能再滴，擦過藥後可用 OK 繃輕敷於疣之表面。

不良反應： 用藥部位過敏、發炎、疼痛、皮膚刺激。灼熱感、發紅、搔癢、皮疹、紅斑、脫皮、乾燥。皮膚肥大、腫脹。用藥部位變色、皮膚變色。接觸健康皮膚造成起泡、皮膚剝落。過敏性皮膚炎。

注意事項：

1. 本藥僅供外用，不可口服。
2. 勿使用超過 12 週。
3. 不建議使用於面積超過 5 平方公分(約一張郵票的大小)的疣。
4. 勿使用於開放性傷口、刺激不適或發紅的皮膚，或任何受感染的部位。
5. 勿使用於黑痣、胎記、生殖器疣、臉部或黏膜部位(如眼、鼻或口)的疣，或是長毛、有紅色邊緣或顏色不尋常的疣。

懷孕期：

1. **Salicylates** cross the placenta (Østensen 1998). Systemic absorption of topical salicylic acid occurs and varies depending on duration and vehicle (~9% to 25%) and is increased with occlusion (Akhavan 2003).
2. For the topical treatment of acne or warts, salicylic acid can be used in pregnant women if the area of exposure and duration of therapy is limited, although other agents may be preferred (Murase, 2014).

授乳期：

1. For the topical treatment of warts, **salicylic acid** can be used in breast-feeding women (systemic absorption is usually minimal) (Butler 2014).
2. Breast-feeding women should avoid use around the chest area to prevent exposure to the nursing child.