

Fluticasone Propionate

【TFLI5】Flixotide® Evohaler 50 50mcg/Dose, 120Doses/Bot

ATC Code : R03BA05

中文名： 輔舒酮優氟吸入劑 «GSK»

適應症： 用於預防性治療成人及兒童氣喘。

用法用量： **Administration:** for oral inhalation only.

Dosage regimens:

Adults & Children ≥ 16 yr:

—Mild asthma:

100 to 250 mcg (2-5 puffs) twice daily

—Moderate asthma:

250 to 500 mcg (5-10 puffs) twice daily

—Severe asthma:

500 to 1000 mcg (10-20 puffs) twice daily

Children 4-16 yr:

50-100 mcg (1-2 puffs) twice daily

There is no need to adjust the dose in elderly patients or in those with hepatic or renal impairment.

不良反應： 可能會引起咳嗽、聲音嘶啞、喉嚨輕微不適、口乾、頭痛，或部份病人有咽喉念珠菌感染等。

交互作用：

- **DESMOPRESSIN:** Concurrent use of Desmopressin and glucocorticoids may result in increased risk of severe hyponatremia.

注意事項： 1、本品不宜用於急性發作，但適用於例行的長期治療。
2、為減少口腔咽喉發生念珠菌感染之機率，應教導病患在每次給藥後以水漱口。

懷 孕 期：

- 在孕婦方面目前只有一些有限的資料。
- 只有當預期對母親的治療效益大於可能對嬰兒的危險時，才可在懷孕期間投予 FLIXOTIDE。

授 乳 期：

- Fluticasone propionate 是否會分泌於人類乳汁中尚未被研究。
- 只有在對母親的預期效益高於嬰兒可能面臨之任何風險的情況下，才可考慮於授乳期間使用本藥。

備 註： 本品使用環保推進劑 hydrofluoroalkane (HFA)。

**全民健保藥品給付規定：依「呼吸道疾患吸入製劑給付規定」辦理。