

Foster NEXThaler

【TFOT】Foster® NEXThaler® 100/6 mcg, 120 Dose/Bot

ATC Code : R03AK08

中文名：肺舒坦耐舒樂乾粉吸入劑 《友華生技》

主成分：Each Dose contains：

Beclomethasone Dipropionate ……100 mcg

Formoterol Fumarate Dihydrate…….6 mcg

適應症：1.用於需規律使用吸入型皮質類固醇與長效 beta 2-致效劑合併治療的氣喘病人。
2.慢性阻塞性肺病 (COPD)。

藥理分類：Corticosteroid, Inhalant (Oral); Beta2-Adrenergic Agonist, Long-Acting.

用法用量：Administration: Foster NEXThaler 應以經口吸入方式使用。

Indications and Dosage regimens:

氣喘：

--A. 維持療法：病人隨身攜帶短效型支氣管擴張劑，以供緊急時使用。

成人（18 歲及以上）病人的劑量建議：

- 一天 2 次，每次吸入 1 或 2 劑。
- 每日劑量上限為 1 天 4 劑。

--B. 維持與緩解療法：

※病人應攜帶每日維持劑量所需的 Foster NEXThaler，並於出現氣喘症狀時額外使用 Foster NEXThaler。病人隨身攜帶 Foster NEXThaler 供緊急時使用。

成人（18 歲及以上）病人的劑量建議：

- 一天 2 次，每次吸入 1 劑（早晚各一劑）。
- 出現氣喘症狀時可額外多吸入 1 劑，幾分鐘後如果症狀仍然持續，應多吸入 1 劑。
- 每日劑量上限為 1 天 8 劑。

於未滿 18 歲兒童及青少年的安全性與療效目前尚未確立。

慢性阻塞性肺病 (COPD)：

成人（18 歲及以上）病人的劑量建議：

- 一天 2 次，每次吸入 2 劑。

不良反應：聲音沙啞、頭痛、口腔、喉嚨念珠菌感染、心悸。

注意事項：

1. 保護蓋應隨時蓋上，需要從吸入器吸入藥劑時才能打開。如果病人已打開吸入器但未吸入藥劑，並蓋上保護蓋，則藥劑會退回吸入器內的藥粉儲存槽，故下一劑藥物仍可安全地吸入。如果病人並未經由吸入器吸入藥物，則蓋上保護蓋時，外殼上窗口所顯示的劑量數不會減少。
2. 每次吸入後應以清水沖洗口腔或漱口或刷牙。
3. 開封使用後請儲存於 25°C 以下之環境(不需冷藏)，最長可存放 6 個月。
4. 甲狀腺毒症、糖尿病、嗜鉻細胞瘤、未治療的血鉀過低等必須謹慎使用。
5. 患者從吸入器吸氣時，應盡可能在站立時或坐姿時保持直立的姿勢。
6. 為了治療可能發生的急性氣喘發作，應建議病人隨身攜帶其短效型支氣管擴張劑備用，可使用 Foster NEXThaler（以 Foster NEXThaler 進行維持與緩解療法的病人），或其他短效型支氣管擴張劑（僅以 Foster NEXThaler 作為維持療法的病人）。
7. 緩解用的 Foster NEXThaler 應於出現氣喘症狀時使用，但不可作為例行性的預防，例如不可在運動前使用。例行性的預防應考慮使用其他短效型支氣管擴張劑。

懷孕 期：1.懷孕期間（尤其是懷孕後期）或是分娩過程中，除非沒有其他（更為安全）已有充分使用經驗的替代藥物，否則不建議使用 formoterol。惟有預期效益勝

於潛在風險時，方能考慮在懷孕期間使用 **Foster® NEXThaler®**。

2.懷孕婦女使用 **Foster® NEXThaler®**的相關臨床數據仍然欠缺。以高劑量皮質類固醇使用於懷孕動物，可引起胎兒發育異常，包括顎裂及子宮內生長遲緩。beta 2-類交感神經藥物具有抑制子宮收縮的作用，在分娩之前應特別留意。

授乳期：

1.惟預期效益勝於潛在風險時，授乳婦女方能考慮使用 **Foster® EXThaler®**。務必於考量哺乳對孩童的益處和治療對婦女的益處後，決定是否停止授乳或停用/不使用 **Foster® NEXThaler®**的治療。

2.人類授乳期間使用 Foster NEXThaler 的相關臨床數據，目前仍然欠缺。儘管目前尚無任何動物實驗的數據，但可合理假設，beclometasone dipropionate 會像其他皮質類固醇分泌至乳汁內。