

## Doxepin HCl

【TICH】Ichderm<sup>®</sup> Cream 5% 8g/Tube

ATC Code : D04AX91

中文名：普膚乳膏 «美時化學»

適應症：成人濕疹性皮膚炎（如異位性皮膚炎或單純性慢性苔癬）所致中度搔癢症之短期治療。

藥理分類：**Topical Skin Product.**

作用機轉：Doxepin has H<sub>1</sub> and H<sub>2</sub> histamine receptor blocking actions, the exact mechanism by which it exerts its antipruritic effect is unknown.

用法用量：Apply 4 times daily, with an interval of at least 3-4 hr between applications. Safety and efficacy in pediatric patients have not been established.

不良反應：1.全身性副作用：嗜睡（22%）、煩渴、頭痛、暈眩。  
2.局部性副作用：灼熱與叮咬感（21%）、皮膚乾燥、緊繃、感覺異常。

交互作用：1.酒精性飲料會加強本藥膏的鎮靜副作用。  
2.Cimetidine 可能會導致 TCA 血中濃度波動，而加重抗膽鹼副作用。  
3.須在 MAOI 停用 2 星期後，方可使用本劑。

注意事項：1.目前尚無資料證明本藥膏使用超過 8 天以上的安全性與療效。  
2.若塗敷面積超過體表的 10%，較易導致顯著嗜睡及全身性的副作用。  
3.應提醒病患使用本品治療期間注意開車或危險機械操作時之安全性，如嗜眠情形難以忍受，則可減少給藥次數或劑量，甚至停用本藥。

懷 孕 期：動物試驗並未發現影響生育力或對胎兒有傷害之證據。然而並未於人類孕婦進行適當之對照試驗，因此孕婦應於明確臨床需要下才使用 Ichderm<sup>®</sup> Cream。

授 乳 期：本乳膏局部使用會有顯著全身性血中濃度出現，仍有分泌至乳汁的可能性。宜先權衡治療之必要性方始投與。

給付規定：全民健保藥品給付規定—Doxepin HCl Cream（如 Ichderm<sup>®</sup>）：  
限成人使用，每次處方不超過 7 天。