

sumatriptan

【TIMIG】Imigran® Nasal Spray 20mg/0.1mL

ATC Code : N02CC01

中文名：英明格鼻用噴液劑 20 毫克 «GSK»

適應症：有先兆或無先兆偏頭痛發作之急性緩解，本藥僅適用於有明確診斷之偏頭痛。

藥理分類：Antimigraine Agent; Serotonin 5-HT_{1B}, _{1D} Receptor Agonist

藥物特性：鼻內給藥用噴霧器。這種裝置可以遞送 0.1 毫升的水性緩衝溶液，其中含有 sumatriptan 20 毫克。此種溶液有一種特有的味道。

用法用量：Administration: For intranasal use. Administer as soon as symptoms appear.

Dosage regimens:

Note:

- Triptans **should not** be used within 24 hours of the use of an ergotamine preparation or a different triptan.
- Administration early in the course of a migraine attack, at the first sign of pain, may improve response to treatment.

劑量與用法:

成人(18 歲以上):

- 本藥最適當的劑量為單一鼻孔給予 20 毫克。
- 如果患者對於本藥的第一次劑量沒有反應，第二次劑量不可以用於同一次發作。
- 本藥可以用於之後的發作。
- 如果患者對於本藥的第一次劑量有反應，但症狀再度出現，則可在 24 小時以內給予第二次劑量，但這二個劑量之間應至少相隔 2 小時。
- 本藥在 24 小時的間隔內不可使用超過二次之 20 毫克鼻用噴液劑。

青少年(12-17 歲):

- 本藥最適當的劑量為單一鼻孔給予 10 毫克。但由於患者在偏頭痛發作和對本藥吸收程度的個體間和個體內差異，某些患者之發作情況可能使用 20 毫克才有效。
- 如果患者對於本藥的第一次劑量沒有反應，不應施予第二次劑量於同一次發作。
- 本藥可以用於之後的發作。
- 如果患者對於本藥的第一次劑量有反應，但症狀再度出現，則可在 24 小時以內給予第二次劑量，但這二個劑量之間應至少相隔 2 小時。
- 本藥在 24 小時的間隔內不可使用超過二次之 20 毫克鼻用噴液劑。

兒童(12 歲以下):

本藥對兒童的安全性和有效性尚未確立。

不良反應：暈眩、昏睡感、感覺異常和感覺減退。暫時血壓上升。潮紅。呼吸困難。噁心與嘔吐。疼痛、灼熱感或冷感、壓迫感。感覺虛弱、疲倦。

交互作用：

- 本藥不可與含有麥角胺(ergotamine)或麥角胺衍生物(methylsergide)的製劑併用。※給予任何含有 ergotamine 的製劑之後，至少要經過 24 小時才能再給予本藥。反之，給予本藥之後，至少要經過 6 小時才能再給予任何含有 ergotamine 的製劑。
- 本藥和單胺氧化酵素抑制劑(MAOI)不可同時投予。本藥也不可在單胺氧化酵素抑制劑停藥後兩星期以內使用。
- 血清素再吸收抑制劑(SSRI)、血清素正腎上腺素再吸收抑制劑(SNRIs)：可

能發生血清素症候群(包括精神狀態改變、自律神經失調、以及神經肌肉異常)的現象。如果需要同時使用 sumatriptan 及 SSRI/SNRI，要觀察患者。

注意事項：

1. 本藥不可使用於高血壓未受控制的患者。
2. 本藥**不宜用作預防**偏頭痛發作。使用劑量**不應超過建議劑量**。一般建議在偏頭痛發作時應儘早給予本藥，但不論何時給藥都會產生相同的效果。
3. 偏頭痛或本藥的治療可能會導致嗜睡。從事技術性工作，開車或操作機器的患者應當特別小心。
4. 本藥不宜使用於下列患者：曾患有心肌梗塞、缺血性心臟病(IHD)、Prinzmetal 氏/冠狀血管痙攣、周邊血管疾病、或有符合 IHD 的症狀或徵候。有腦中風(CVA)或短暫性缺血症發作(TIA)病史。肝功能嚴重受損。
5. **肝功能**受損(Child Pugh A 或 B 級)或**腎功能**受：應小心使用。
6. 曾有**癲癇**病史或具有其他使癲癇發作閾值降低之危險因子者：應小心用。
7. 對 **sulphonamide 過敏**的患者使用本藥後可能會出現過敏反應。

懷 孕 期：

- 在使用前須先對母親的預期效益相對於對胎兒可能造成的危險性作評估。
- 資料記錄(超過 1,000 位)：結果並未偵測到有增加畸形生產的頻率。

授 乳 期： 已證實皮下注射 sumatriptan 將會排入乳汁中。故應避免於投藥後 12 小時內哺乳，以將嬰兒曝露於此藥中的可能降至最低。

儲 存； 儲存於 2-30°C。保存在密封的泡囊中，最好儲存在盒子裡面避光。