

Pilocarpine HCL

【TISO】Isopto® Carpine 2% Oph. Solution 15mL/Bot

ATC Code : S01EB01

中文名：愛舒特開明眼藥水 2% «Alcon»

適應症：縮瞳劑用於控制慢性青光眼之眼壓。

成分：Each mL contains:

Pilocarpine Hydrochloride ..... 20 mg

賦型劑：Benzalkonium chloride、boric acid、sodium citrate、hypromellose、hydrochloric acid/sodium hydroxide (調整 pH 值)、純水。

藥理分類：**Ophthalmic Agent, Antiglaucoma; Miotic.**

用法用量：1-2 gtts TID-QID.

不良反應：頭痛、頭暈、視線模糊、噁心。

注意事項：

1. 支氣管氣喘病患應慎重給藥（本品可能使氣喘現象增強）。
2. 對於孕婦或可能已懷孕婦女，非必要請勿使用，因本品可能引起子宮肌肉的收縮。
3. 使用本品時原則上患者採臥姿，點藥在結膜囊內，閉眼 1-5 分鐘，輕壓淚囊後張開。
4. Isopto® Carpine 點眼液會大幅影響駕駛與操作機器的能力。縮瞳劑可能會造成視線模糊與難以適應黑暗。建議病患於夜間駕駛時或於光線不佳處進行危險工作時，應格外謹慎。
5. 開封 4 週後應丟棄不用。
6. Isopto® Carpine 點眼液含有 benzalkonium chloride，此成分可能會引起眼部刺激，且已知 會使軟性隱形眼鏡變色。應避免軟式隱形眼鏡接觸本品。請務必指示病患在使用 Isopto® Carpine 前取下隱形眼鏡，並在用藥至少 15 分鐘後再重新配戴。

懷 孕 期：目前幾乎沒有 Isopto® Carpine 點眼液使用於懷孕女性的資料。然而，動物研究顯示，大鼠全身性暴露於 pilocarpine 時會造成生殖毒性的有害作用。不建議於懷孕期間使用 Isopto® Carpine 點眼液。

授 乳 期：目前未知 pilocarpine 是否會分泌至人類乳汁中。然而，應預期會分泌至母乳中。目前也未有 哺乳期間使用 pilocarpine 眼用製劑的安全性資料。然而，無法排除對哺乳嬰兒的風險。應考量哺乳對於嬰兒的利益以及母親接受治療的利益，來決定是否停止哺乳或停止/避免以 Isopto® Carpine 點眼液治療。