

Travoprost

【TIZB】IZBA® Oph. Solution 0.003% 2.5mL/Bot

ATC Code : S01EE04

中文名： 易舒壓點眼液 0.003% «愛爾康»

適應症： 適用於降低高眼壓或隅角開放性青光眼成年患者之眼壓。

藥理分類： Ophthalmic Agent, Antiglaucoma; Prostaglandin.

用法用量： **Administration: Ophthalmic. For topical ophthalmic use only.**

Dosage:

One drop into affected eye(s) once daily in the evening.

Note: The dosage **should not exceed once daily** since it has been shown that more frequent administration may decrease the intraocular pressure lowering effect.

Reduction of intraocular pressure starts approximately 2 hours after administration and the maximum effect is reached after 12 hours.

不良反應： 眼部充血、視力減退、眼睛不適、痛及搔癢、虹膜變色。

注意事項：

1. 每天早上或晚上點一滴於眼睛，每日 1 次，請於每日同一時間使用。
如忘記點藥，請於下一次應點藥的時間再點藥即可。
2. 每日每眼用量請勿超過 1 滴。
3. 開瓶 4 週後請勿繼續使用。
4. 點藥期間不要戴隱形眼鏡，給藥 15 分鐘後再重新戴上。
5. 建議點藥後壓住鼻側之眼角(鼻淚管)，並閉起眼瞼 2 分鐘，可降低藥物經由眼睛吸收至全身的比率，以減少全身性副作用的產生。
6. 用於 16 歲以下病人的效果及安全性尚未確立，目前不建議使用。
7. 改變患眼的睫毛(增長、變密、顏色加深及/或睫毛數目的變化)。

懷 孕 期： 除非確實需要，否則不可將 IZBA®點眼液用於懷孕婦女。

授 乳 期： 哺乳婦女使用 IZBA®點眼液需小心。
目前尚未知 travoprost 點眼液是否會分泌至人類乳汁中。動物研究發現 travoprost 及其代謝物會分泌至乳汁中。