

Triamcinolone Acetonide

【TKENL6】 Kenalog (Nincort®) 0.1% Oral Gel 6g/Tube

ATC Code : A01AC01

中文名： 寧康口內膠 0.1% 《杏輝》

適應症： 齒間、口腔粘膜、舌潰瘍性口內炎、口角炎等急慢性炎症之治療，齒槽膿漏、假牙刺激部疾患。

藥理分類： **Corticosteroid.**

用法用量： Apply once daily before bedtime or 2-3 times daily if necessary.

不良反應： 可能會引起局部刺激或過敏現象等。

注意事項： 1.結核病、糖尿病及胃潰瘍患者，須謹慎使用。
2.若使用 7 天仍未見改善，須再就醫檢查。
3.塗擦後暫時避免進食。

懷 孕 期： 1. In general, the use of topical corticosteroids is not associated with a significant risk of adverse pregnancy outcomes.
2. Use of mild to moderate potency topical corticosteroids is preferred in pregnant females and the use of large amounts or use for prolonged periods of time should be avoided (Chi 2016; Chi 2017; Murase 2014).

授 乳 期： 1. It is not known if sufficient quantities of triamcinolone are absorbed following topical administration to produce detectable amounts in breast milk.
2. Do not apply topical corticosteroids to breast until breastfeeding ceases (Leachman 2006).