

Clindamycin phosphate

【TKOL】Kolincin® Gel 10 mg/g，15 g/Tube

ATC Code : D10AF01

中文名：可立信凝膠 10 毫克/公克 《中生生技》

適應症：尋常性痤瘡。

藥理分類：Antibiotic, Lincosamide; Topical Skin Product, Acne.

用法用量：每日兩次，薄敷在患部

不良反應：皮膚乾燥、接觸性皮膚炎、刺激感、革蘭氏陰性毛囊炎。

注意事項：本劑禁用於有區域性腸炎或潰瘍性結腸炎病歷，或有抗生素相關的結腸炎病歷之患者。

懷 孕 期：

- 1.除非有明確需求，懷孕期間不可使用(仿單)。
2. If treatment for acne is needed during pregnancy, topical clindamycin may be considered if an antibiotic is needed.
- 3.To decrease systemic exposure, pregnant women should avoid application to inflamed skin for long periods of time, or to large body surface areas (Kong 2013).

授 乳 期：

- 1.用藥期間不可哺乳(仿單)。
2. It is not known if clindamycin is present in breast milk following topical administration.
3. If clindamycin is used topically to the chest for the treatment of acne in females who are breastfeeding, care should be taken to avoid accidental ingestion by the infant.

儲 存：請儲存於 25 °C 以下。