

Lidocaine

【TLICOP】 Lidocaine Patch 5% 700mg/14g/Patch, 1Patches/Pack ATC Code : D04AB01

【TLICO】 自費 Lidocaine Patch 5% 700mg/14g/Patch, 1Patches/Pack ATC Code : D04AB01

中文名： 利多卡因貼片 5% «意欣»

適應症： 用於緩解皰疹後神經痛（Post-herpetic Neuralgia）。使用部位僅限於未受損的皮膚。

藥理分類： **Analgesic, Topical; Local Anesthetic.**

用法用量： Pain (localized):

Apply patch to painful area. Patch may remain in place for up to 12 hours in any 24-hour period. **No more than 3 patch should be used in a 24-hour period.**

不良反應： 局部皮膚可能發生紅斑、灼熱、搔癢、變色等不良反應。頭痛、焦慮、頭昏眼花、嗜睡。

注意事項： 使用後若有心悸、頭暈、短暫性視覺昏暗或其他心律不整之症狀，應立即撕，並立刻就醫。

懷孕期： 尚無足夠人類資料。除非臨床上確實需要，須謹慎使用。

授乳期： 在授乳婦尚無研究資料。Lidocaine 會分泌於人類乳汁中，乳汁與血漿中 lidocaine 比例是 0.4。授乳婦應小心使用。

健保規定： 1.限使用於帶狀疱疹皮膚病灶後神經痛。
2.限每日最大劑量為3片，且日劑量超過2片時，需於病歷記載理由。
3.不得與 gabapentin 或 pregabalin 成分口服製劑併用。