

Mometasone Furoate

【TMOM】Momenase<sup>®</sup> Aqueous Nasal spray 50mcg/Spray

ATC Code : R01AD09

中文名：樂鼻寧水性鼻用噴液劑 «健喬信元»

適應症：成人青少年及二歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎。亦用於治療 18 歲及以上成人輕度到中度鼻息肉之相關症狀。

藥理分類：Corticosteroid, Nasal.

用法用量：用法：僅供**鼻腔噴霧**使用

- 在本品幫浦初次引水後(通常需 6 或 7 次的擠壓，直到觀察到均勻的噴霧產生)。如果噴霧幫浦 14 天或 14 天以上未曾使用，則再次使用前需重新將幫浦引水。
- 使用前須**充分振搖容器**。
- 輕輕擤出鼻涕以清潔鼻孔。
- 壓住一邊鼻孔。頭部向前微傾，持瓶身向上，小心將噴頭伸進鼻孔。
- 依下列方式\*釋放出噴霧。噴完後自此鼻孔輕輕吸氣。  
\*以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部充分一次壓到底是一個噴劑量。
- 完成吸氣後，**以嘴呼氣**。
- 使用後清潔噴頭時，拔下防塵蓋，輕輕自白色頸部將噴頭拔起，與防塵蓋一起用冷水沖洗。待乾後將其裝回原位。

用量：

#### 1. 季節性或常年性過敏性鼻炎：

成人(包括年老病人)以及青少年：

- 一般預防及治療建議使用劑量，是一邊鼻腔使用兩個噴霧，每日一次(50 mcg/每次噴霧，總劑量 200mcg)
- 一旦症狀得到控制，可降低劑量至每邊鼻腔噴一次(總劑量 100 mcg)就可以有效的維持。
- 如果病狀不能完全的被控制，則使用劑量可以增加至**每日最大劑量**，每一鼻腔 4 次噴霧(**全部劑量是 400 mcg**)，每日一次。
- 同時建議症狀一旦受到控制，便降低使用劑量。臨床上明顯地起始作用時間，出現在第一次劑量使用後的 12 小時之內。

二至十一歲兒童：

- 一般建議劑量為一邊鼻腔使用一個噴霧，每日一次(50 mcg/每次噴霧，總劑量 100 mcg)。

#### 2. 輕度到中度鼻息肉：

18 歲及以上成年人(包括年老病人)：

- 每次每一鼻腔 2 次噴霧，每天兩次(每天總劑量 400 mcg)；
- 一旦症狀適當控制，建議劑量可減少到每一鼻腔 2 次，每天一次(每天總劑量 200 mcg)。

不良反應：頭痛、鼻腔出血、咽喉炎、鼻腔刺激。

注意事項：1.本品僅供噴鼻使用，使用前請先搖勻。

懷 孕 期：懷孕婦女，只有在評估過使用的利益勝於對母親、胎兒的危險性後，才可以給予本品。

授 乳 期：授乳婦女只有在評估過使用的利益勝於對母親、新生兒的危險性後，才可以給予本品。

儲 存：請置於 25°C 以下貯存。